

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 58kg
- 활력징후: BP 118/62 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.6°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 오한, 소화불량, 피로감 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 181cm, 체중은 58kg, BMI는 17.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 4일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성적인 소화불량을 호소하며, 증상은 호전과 악화를 반복한다. 찬바람에 노출될 시 증상이 악화되며, 식이 조절 및 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력으로는 장기간 진통제를 복용했다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 고강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 구역, 구토 증상이 있으며, 부패취와 신물이 올라온다고 한다. 구고(口苦)를 느끼기도 한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애는 없으나 중도 각성이 잦다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10 정도로 경미하게 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/62 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.6°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥