

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:53:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 어혈형 (瘀血型) → 단삼음, 혈부축어탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 57kg
- 활력징후: BP 134/89 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.9°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발병한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 과음, 과식 이후 증상 시작. 스트레스, 장시간 앉기, 음주 시 악화. 잦은 식사, 적은 음수량, 녹색변, 다한, 무력감, 이명, 난청, 황색 면색 등의 소견.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 170cm, 체중은 57kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소한다. 회식 후 과음, 과식 이후 증상이 시작되었으며, 스트레스, 장시간 앉기, 음주 시 증상이 악화되고 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토,

부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 무거움. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5).
- 한열: 보통, 온수 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗), 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증 강도 4/10).
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 무기력감을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 134/89 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.9°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5.
- 면색: 황색.

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 대/태
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥