

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 70kg
- 활력징후: BP 155/92 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.6°C

■ 요약

60세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 고혈압 및 당뇨 가족력이 있다. 최근 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 170cm, 체중은 70kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소하며, 증상이 악화 중이다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하는 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 낮에 9회, 밤에 1회 소변을 보며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/92 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하지 않으며 가려움증은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약