

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:23:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 68kg
- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.2°C

■ 요약

76세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화됨. 변비, 흑색변, 수족냉증, 어지럼증, 이명, 난청 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 68kg, BMI는 23.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 장기간 진통제 복용

후 속쓰림이 심해졌으며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 장시간 앉아 있는 자세, 과로, 습한 환경 등이 증상을 악화시키며, 스트레칭 및 식이 조절 시 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.2℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 이명(3/5), 난청(3/5)이 있다. 어지러움(5/5)을 호소한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭