

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 80kg
- 활력징후: BP 178/108 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.2°C

■ 요약

55세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량 및 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 동반하고, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 80kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 증상은 악화되는 추세이다. 기름진 음식 섭취, 스트레스, 흡연 시 증상이 악화되며, 휴식 및식이 조절 시 증상이 완화된다. 환자는 복만/복통 (3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등의 소화기 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

환자는 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 현병력을 가지고 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽은/연변을 보인다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (2/5), 중도각성 (True/5)을 보인다.
- 한열: 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 무한(無汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망을 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 178/108 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.2℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활