

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 84kg
- 활력징후: BP 106/64 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.4°C

■ 요약

54세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 84kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 증상은 주로 기름진 음식 섭취, 장시간 앉아있는 자세, 스트레스 상황에서 악화되며, 따뜻하게 하거나 수면을 취하면 완화된다. 환자는 속쓰림, 복부팽만감, 구역감, 신물, 구고(口苦) 등의 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황갈색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다. 무한(無汗) 경향을 보인다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/64 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.4°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 얇다(소).
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴