

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:24:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 50kg
- 활력징후: BP 140/92 mmHg, 맥박 50/분, 체온 37.8°C

■ 요약

63세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 오한, 무한, 변비, 잦은 야간뇨, 피로감, 사지무력감, 이명, 저체온 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 50kg, BMI는 16.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 6일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 수면부족, 기름진 음식 섭취, 찬바람/냉기에 노출 시 악화되고,식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 동반

증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 복만, 복통, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고 주간 6회, 야간 3회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 정도 있으며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 더운 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며 (無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/92 mmHg, 맥박 50회/분, 체온 37.8℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 절로 멍이 잘 생긴다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 삼맥이다.
- 복합맥상: 침긴맥이다.