

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 열증형 (熱證型) → 황련해독탕, 반하사심탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 49kg
- 활력징후: BP 153/96 mmHg, 맥박 68/분, 체온 38.2°C

■ 요약

14세 남학생 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 야식 후 속쓰림으로 시작되었으며, 복만, 복통, 신물, 구고 등의 소화기 증상과 함께 다한, 흑색변, 혈뇨, 하지부종, 전신 무력감, 피부 가려움, 이명, 난청, 홍조 등의 증상을 동반한다. 과로 시 증상 악화되며, 따뜻하게 하거나 휴식 시 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 163cm, 체중은 49kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 야식 후 속쓰림으로 시작된 기능성 소화불량을 호소한다. 복만, 복통(4/5), 신물, 구고,

부패취 등의 증상이 있으며, 과로 시 악화되고 따뜻하게 하거나 휴식 시 완화된다. 수족냉증을 동반하며 구역/구토 증상이 나타나기도 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 있으며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗)이 나타나며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/96 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 38.2℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청 정도는 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대