

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 144cm / 33kg
- 활력징후: BP 115/74 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.6°C

■ 요약

11세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화됨. 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 남 환자로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 33kg, BMI는 15.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 장기간 진통제 복용 이후 속쓰림이 더욱 심해졌다고 한다. 주 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 음주 및 수면 부족 시 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 진통제 장기 복용력이 있다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 학생으로, 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 낮고, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도 각성은 5회 중 True이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/74 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5 정도이며, 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥