

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:35:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 59kg
- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.0°C

■ 요약

40세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 과로 시 증상 악화, 수면 시 완화되는 경향을 보임. 잦은 소화불량과 더불어 수족냉증, 어지럼증, 땀흘린 후 열감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 169cm, 체중은 59kg, BMI는 20.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 8시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 발생하여 지속적으로 불편함을 느끼고 있다. 증상은 주로 복만감, 복통,

구역감, 신물 오름, 잦은 트림, 구고 등을 동반한다. 과로 시 증상이 악화되며, 충분한 수면을 취하면 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다. 최근 어지럼증을 심하게 느껴 일상생활에 불편함을 느끼고 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 호소한다. 수족냉증 또한 동반되어 불편함을 가중시킨다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 25개피/일, 운동강도는 낮은 편이다. 생리주기는 35일로 불규칙하며, 생리 기간은 7일, 생리통은 1/10 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 자주 느낀다. 오심 및 구토 증상이 나타날 때가 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있고, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.0°C, 호흡 10회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 부종은 없다. 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.

- 설태: 황태이며 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥