

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:36:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 음허형 (陰虛型) → 익위탕, 마자인환
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 63kg
- 활력징후: BP 118/72 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.6°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림이 시작됨. 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 찬바람, 음주, 장시간 앉는 자세에 의해 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 63kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 전 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 이후 기능성 소화불량 증상이 지속되고 있다. 찬바람/냉기(冷氣), 음주(飲酒), 장시간 앉기(久坐) 등의 요인에 의해 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 평소 더위를 타지 않으며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/72 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 절로 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5. 어지러움 5/5.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 황색의 후태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 침긴