

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 59kg
- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.7°C

■ 요약

51세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 야식 후 속쓰림이 시작되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 160cm, 체중은 59kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 속쓰림, 복만, 복통을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 무거운 짐을 들거나 흡연 시, 기름진 음식을 섭취 시 악화된다고 한다. 수면 시에는 증상이 완화되는 경향을 보인다. 현재 이상지질혈증,

고혈압, 당뇨로 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 감기 증상(발열, 오한, 콧물, 기침), 비염 증상(재채기, 코막힘, 코 가려움)은 호소하지 않는다. 요통은 경미한 수준(1/10)으로 나타난다. 소화불량 증상으로 수족냉증과 구역/구토를 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았다. 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회, 규칙적으로 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 10시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번 발생하며, 중도각성은 5번 발생한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 전신에 땀이 나고 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통이 있으며, 강도는 1/5이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/85 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명은 정상이다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.

- 설태: 백태이며, 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥