

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 82kg
- 활력징후: BP 101/61 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.3°C

■ 요약

31세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 고혈압 병력 있으며, 불규칙한 식사 후 증상 발현. 잦은 대변, 적색뇨, 전신 부종, 사지무력감, 이명, 어지럼증, 흉조 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 82kg, BMI는 33.3이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 7일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 약 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 주된 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취 등이 있다. 악화 요인으로는 흡연과 기름진 음식 섭취가 있으며, 수면과 휴식 시

증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 34일로 불규칙하며, 생리통은 10점 만점에 0점이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨가 나타나며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 3/10이다. (통증 양상은 없음)
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/61 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.3℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크며, 치흔설이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥