

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:19:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 73kg
- 활력징후: BP 104/67 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.0°C

■ 요약

66세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며 당뇨약 복용 중. 기름진 음식 과식 후 증상 악화.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 149cm, 체중은 73kg, BMI는 32.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 수개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 기름진 음식을 섭취 시 증상이 악화되며, 스트레칭이나 따뜻하게 하면 다소

완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 당뇨약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피로 흡연력이 미미하다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회 소변을 보며, 혈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 통증 양상은 다양하지 않다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/67 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 느끼며, 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크며, 치흔설이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대