

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:20:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 158cm / 42kg
- 활력징후: BP 111/60 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.1°C

■ 요약

13세 남학생, 6개월 이상-1년 이내 기능성 소화불량으로 내원. 과거 고혈압 가족력, 습한 환경에서 악화, 식이조절 시 완화. 흑색변, 혈뇨, 잦은 소변, 얇은 수면, 수족냉증, 사지무력감, 피부 가려움, 이명, 어지럼 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 158cm, 체중은 42kg, BMI는 16.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 식이조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 복만 및 복통을 4/5

강도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 12회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피곤함을 호소, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5.
- 한열: 오한/추위를 타며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통, 두부에 땀을 흘리며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/60 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지럼증은 3/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥푹(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활