

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 71kg
- 활력징후: BP 118/75 mmHg, 맥박 85/분, 체온 37.9°C

## ■ 요약

41세 여성 환자로, 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 발생한 소화불량 증상과 함께 피로감, 하지 부종, 이명, 어지럼 등을 호소한다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 71kg, BMI는 27.7이다.

### 【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 지속적으로 악화되는 추세이며, 음주, 찬바람/냉기, 무거운 짐을 들 때 악화된다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

## 【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 29일이며, 불규칙하다. 생리 기간은 5일이며, 생리통은 6/10 정도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 깊은 잠을 자지만 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕은 높은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/75 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 37.9°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피로감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 정상이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 얇다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활