

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 83kg
- 활력징후: BP 133/84 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.0°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심화되어 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 83kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었으며, 휴식 및 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 복만/복통은 4/5 정도로 나타나며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일이며, 불규칙하고, 기간은 0일, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소하고, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 보통의 양이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에 걸쳐 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/84 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.0℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고, 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭