

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 74kg
- 활력징후: BP 135/82 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.1°C

■ 요약

42세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화됨. 변비, 수족냉증, 피로감을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 74kg, BMI는 33.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 6일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 간헐적으로 속쓰림, 복만, 복통을 느껴왔다. 증상은 장기간 진통제 복용 이후 더욱 심해졌으며,식이 조절 및 온찜질 시 일시적인 완화 효과가 있다. 최근에는 수족냉증, 구역감,

부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반되고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중등도로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/82 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.1℃, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥, 홍삭