

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:21:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 72kg
- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.1°C

■ 요약

56세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 증상 시작. 변비, 수족냉증, 잦은 음주, 무력감 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 161cm, 체중은 72kg, BMI는 27.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아있을 때 악화되는 경향을 보인다. 환자는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고

등의 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 폐경 상태이며, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었고 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화가 잘 되지 않는다. 오심과 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 정도 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 날 때가 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이며, 면색은 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 삼맥