

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 72세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 45kg
- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 92/분, 체온 37.2°C

■ 요약

72세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 악화. 기존 이상지질혈증, 당뇨 병력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 72세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 150cm, 체중은 45kg, BMI는 20.0이다.

【주소증】

1년 이상부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 2일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 스트레스가 심한 업무 이후 증상이 악화되었다고 한다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 앉아있는 시간이 길어지면 증상이 악화되고,

수면을 취하면 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 빈뇨(9회)가 있다. 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 잠들기 어렵고(입면장애 1/5), 자다가 자주 깬다(중도각성 True/5). 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 추위를 많이 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 37.2℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움증은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 설체가 크다.
- 설태: 백태가 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 대활