

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:22:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 한증형 (寒證型) → 이중탕, 안중산
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 74kg
- 활력징후: BP 102/77 mmHg, 맥박 108/분, 체온 37.8°C

■ 요약

60세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기능성 소화불량 증상을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림으로 시작되었고, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반함. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며 혈압약을 복용 중. 맥은 부, 세, 활맥을 띠고 설질은 담백하고 혀의 크기는 작으며, 설태는 백태와 박태가 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 186cm, 체중은 74kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 야식 후 발생한 속쓰림으로 시작되었으며, 이후

수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 동반되었다. 증상은 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출될 때 악화되는 경향을 보이며, 식이 조절 및 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며(無汗), 두부에서 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/77 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 37.8°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감이 있고, 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥