

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 56kg
- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.0°C

■ 요약

41세 남성 환자로 3개월 전부터 시작된 알레르기 비염 증상과 흑색변, 피로감을 호소한다. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력이 있으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다. 최근 집 대청소 후 증상이 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 56kg, BMI는 16.5이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 또한 흑색변, 피로감을 호소한다.

【발병 에피소드】

최근 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발생하였다. 증상은 습한 환경과

찬바람에 노출될 때 악화되며, 온찜질을 하면 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상으로 발열은 없으며 오한 또한 호소하지 않는다. 콧물은 지속적으로 흐르고 있으며, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 약간 있는 편이다. 코가려움은 경미하여 무시할 만한 정도이다. 요통은 통증 강도 2/10으로 경미하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력이 있으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 매일 음주를 하고 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화 상태는 좋지 않다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 묽거나 연변의 형태이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.

- 설태: 백태가 두껍게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥