

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 71kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.3°C

■ 요약

48세 남성, 1개월 전 직장 내 사무실 이동 후 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 고혈압, 이상지질혈증 과거력 및 수면 부족, 기름진 음식 섭취 등의 악화 요인 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 71kg, BMI는 23.7이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 직장에서 새 사무실로 이동한 후 4일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 사무실 이전 후 비염 증상(콧물, 코막힘, 코 가려움), 요통, 소화불량이 발생하여 점차 악화되는 경과를 보이고 있다. 비염 증상으로 콧물이 심하게 흐르고 코막힘이 있으며, 코 가려움이 동반된다고 한다. 요통은 통증 강도

4/10 정도이며, 소화불량은 복만 및 복통을 동반한다. 수면 부족과 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나빠지며, 기억력이 저하되었다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다. 면색은 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색맥