

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:29

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 55세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 60kg
- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

55세 여성, 6개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 55세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 60kg, BMI는 24.7이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 비염 증상이 발생하였으며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 따뜻하게 하거나 식이조절을 하면 증상이 다소 완화된다고 한다. 감기 증상으로 발열은 없으나, 콧물이 심하고 간헐적인 기침이 있다. 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하다. 소화불량으로 복만감 및

복통이 있으며, 불편함은 2/5 정도이다.

【과거력】

특이사항 없음

【가족력】

고혈압, 당뇨

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 낮은 편이다. 생리주기는 22일로 불규칙하며, 폐경 상태이고, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 한다. 소화는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며, 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.3℃, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있으나 가려움은 없다. 이명은 2/5 강도이며, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 4/5 강도이다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:38

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 82kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

46세 남성 환자로, 3개월 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 발생한 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기비염 증상과 함께 요통, 소화불량, 사지무력감, 수면장애, 흑색변, 땀흘린 후 열감, 수족냉증, 기억력 저하 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 82kg, BMI는 24.8이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 더불어 요통, 소화불량, 사지무력감, 수면장애, 흑색변, 땀흘린 후 열감, 수족냉증, 기억력 저하 등을 동반하고 있다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】



상기 환자는 3개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되었으며, 증상의 호전과 악화가 반복되는 양상을 보인다. 재채기는 빈번하게 나타나며, 콧물은 지속적으로 흐르는 양상이다. 코막힘은 호흡을 불편하게 할 정도로 심하며, 코가려움 또한 일상 생활에 지장을 줄 정도로 심하다고 호소한다. 요통은 통증 강도 4/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 4/5 정도로 나타난다. 장시간 앉아있는 자세와 스트레스가 증상을 악화시키는 요인으로 작용하는 것으로 보인다.

**【과거력】**

당뇨로 진단받고 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이나, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 3회.
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 피로감을 느끼며, 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 4/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 부종은 없고 멍은 정상이다. 이명 (1/5), 난청 (1/5), 어지러움 (0/5).
- 면색: 암색

**【설진 소견】**

- 설질: 담백, 소

- 설태: 회태, 니태

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:45

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 54kg
- 활력징후: BP 156/91 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

13세 여성 환자로, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원. 최근 새 카펫 설치 후 증상 악화. 수면 부족, 흡연, 찬바람에 노출 시 악화되며, 휴식 시 완화됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 54kg, BMI는 23.7이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘이 심해졌다고 한다. 수면 부족, 흡연, 찬바람에 노출 시 증상이 악화되며, 휴식 시 증상이 완화된다고 한다. 감기 증상으로는 발열은 없으며 저체온을

보이고, 콧물이 계속 흐르는 증상이 있다. 비염 증상으로는 간헐적인 재채기, 약간의 코막힘과 코가려움이 있다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로는 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일 정도이며, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 10시간, 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 열감/더위를 타는 경향이 있으며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력감을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/91 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.3℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 삼맥(滯脈)
- 복합맥상: 부색(浮)

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:54

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 69kg
- 활력징후: BP 159/91 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

30세 남성, 2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하는 환자. 직장 내 사무실 이동 후 증상 시작. 당뇨 및 이상지질혈증 기저질환 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 69kg, BMI는 24.4이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 4일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 콧물이 심하게 흐르고 코 주변 피부가 헐어 불편감을 느낀다고 한다. 재채기를 자주 하며 코막힘으로 숨쉬기 약간 불편하고 코가려움 증상도 일부 있다. 요통은 강도

4/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 증상은 호전 중이며, 기름진 음식을 섭취하면 악화되고 스트레칭이나 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

**【과거력】**

기저 질환으로 당뇨 및 이상지질혈증을 앓고 있으며, 관련 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 중풍 이력이 있다.

**【사회력】**

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 의욕이 낮으나 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 159/91 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.7℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 0/5 이며, 어지러움은 3/5 강도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 66세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 69kg
- 활력징후: BP 108/72 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

66세 여성 환자로, 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 66세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 69kg, BMI는 29.1이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었으며, 요통은 강도 4/10으로 지속되고 있다. 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 습한 환경에서 증상이 악화되고 휴식 및 안정을 취하면 완화되는 경향을 보인다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

## 【가족력】

특이 가족력은 없다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 여성력으로는 생리주기 28일, Menopause이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 108/72 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 크다.
- 설태: 회색이며, 두껍다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:09

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 146cm / 47kg
- 활력징후: BP 113/62 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

13세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 47kg, BMI는 22.0이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

집 대청소 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상이 악화되었으며, 콧물, 코막힘, 코가려움 증상을 호소한다. 콧물은 심하여 휴지를 자주 사용하게 되며, 코를 푸는 횟수가 늘었다고 한다. 요통은 통증 강도 2/10이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다. 악화요인으로 음주와 습한 환경을 언급하였고, 식이조절과 휴식 시 증상

완화를 느낀다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이다. 소화불량을 호소하며, 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간/도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 113/62 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이며, 복합맥상으로 부허맥이 나타난다.

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:17

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 42kg
- 활력징후: BP 141/98 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

11세 여성 환자로, 1년 이상 만성 알레르기 비염을 앓고 있으며, 최근 환절기 기온 변화로 증상 악화되어 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 11세 여성 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 42kg, BMI는 22.1이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염을 앓고 있으며, 주 증상으로 심한 콧물, 코막힘, 코가려움 등이 있다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기 힘들어한다. 코 주변 피부가 빨개지고, 코가려움으로 자주 비벼 신경 쓰인다고 한다. 재채기는 간헐적으로 어쩌다 한두 번 정도 한다. 환절기 기온 변화와

스트레스에 의해 증상이 악화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 학생으로, 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 1/5 정도 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 대변 상태는 보통이다.
- 소변: 붉은 색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5 정도이며, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 다한 증상이 있으며, 전신에 땀을 흘리고, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕은 보통이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 141/98 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.3℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상
- 설태: 황태, 니태



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:25

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 70kg
- 활력징후: BP 131/82 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

18세 여성 환자로, 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 169cm, 체중은 70kg, BMI는 24.5이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 새로 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상 (지속적인 재채기, 약간의 코막힘, 잦은 코 가려움)을 호소한다. 콧물은 심하게 흐르는 양상을 보이며, 휴지를 자주 사용하게 된다고 한다. 또한 요통 (통증 강도 4/10)과 복만, 복통 (4/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

## 【사회력】

환자는 음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 복만, 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 자지 못하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (0/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)과 복통 (4/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/82 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.2°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지럼증은 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:32

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 143cm / 43kg
- 활력징후: BP 138/83 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

13세 여성 환자로, 1개월 전 황사/미세먼지 노출 후 발생한 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 여 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 43kg, BMI는 21.0이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 증상이 발생하였다. 콧물이 심하여 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 불가능하다고 호소한다. 기침을 자주 하며, 발열은 없고 오한 증상도 없다고 한다. 온찜질을 하면 증상이 완화되는 경향을 보이며, 흡연 및 기름진 음식 섭취 시

증상이 악화된다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 138/83 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증을 느낀다. 부종은 없으나 멍이 절로 생긴다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대/태
- 설태: 황태, 후태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:39

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 37세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 81kg
- 활력징후: BP 149/98 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.0°C

## ■ 요약

37세 여성 환자로, 1주 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화 및 고혈압, 이상지질혈증 병력 보유.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 37세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 81kg, BMI는 30.5이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

집 대청소 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전 집 대청소 후 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 현재까지 증상이 악화되는 추세이다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.



## 【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍 등이 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 2회 하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 탄다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/98 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.0°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이며 어지러움은 경미하다.
- 면색: 창백

## 【설진 소견】

- 설질: 담백, 대/태
- 설태: 황태, 박태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:47

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 61세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 78kg
- 활력징후: BP 126/81 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

61세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원하였다. 이사 후 증상 시작, 수면 부족 시 악화, 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 61세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 185cm, 체중은 78kg, BMI는 22.8이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 재채기 발작이 만성적으로 나타나고 콧물은 계속 흘러 휴지를 자주 사용하게 된다고 호소하였다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬는 데는 불편함이 없으며, 코 가려움은

경미하다. 또한, 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소하였다. 수면 부족 시 증상이 악화되고, 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 3회 정도 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며(0/5), 중도각성 또한 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 126/81 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 회색의 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:55

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 24세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 57kg
- 활력징후: BP 155/97 mmHg, 맥박 104/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

24세 남성 환자로, 6개월 전 직장 내 사무실 이동 후 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량, 전신 무력감 등을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 24세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 57kg, BMI는 21.2이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량, 전신 무력감을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 직장에서 새 사무실로 이동한 후 4일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 지속적으로 나타나고 있으며, 요통은 통증 강도 4/10으로 특별한 양상은 없다. 또한, 복만 및 복통(4/5)과 같은 소화불량 증상을 호소한다. 찬바람이나 냉기에

노출되거나 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되는 경향을 보이며, 혈압약을 복용 중인 고혈압 병력이 있다.

**【과거력】**

고혈압으로 혈압약 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애(5/5)와 중도 각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 155/97 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 36.4°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 피부 건조, 가려움이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 이명(1/5)과 난청(1/5)이 있다. 어지러움(3/5)을 느낀다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 황태와 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 63세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 98kg
- 활력징후: BP 151/90 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

63세 여성 환자로, 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거력 및 가족력은 특이사항 없으며, 변비, 수면의 질 저하, 전신 부종, 사지무력감 등을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 63세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 98kg, BMI는 36.4이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 5일째 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 6개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 봄철 꽃가루가 날릴 때 증상이 더욱 심해지는 경향을 보인다. 코막힘이 약간 있으며 코 가려움이 심해 일상생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 3/10으로 지속되며,

소화불량으로 인한 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동은 중등도로 규칙적으로 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 자주 느낀다. 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 5번 발생한다.
- 한열: 평소 더위를 타거나 추위를 타는 경향은 보통이며, 수족냉증이 있다. 찬 음료보다 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 151/90 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.8℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있는 편이나, 가려움증은 없다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태(膩苔)

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부삭(浮數)

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:11

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 57kg
- 활력징후: BP 104/77 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

73세 여성 환자로 만성 알레르기비염을 주소로 내원, 봄철 꽃가루 노출 후 증상 악화. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 57kg, BMI는 20.2이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염을 주소로 내원하였다. 4일 전 봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 증상이 악화되었다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 4일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 만성 알레르기비염으로 재채기, 코막힘, 코가려움 증상을 호소한다. 재채기는 매일 지속적으로 나타나며, 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하다고 한다. 코가려움은 경미한 정도이다. 감기 증상으로는 발열은 없으며, 콧물은

경미하게 흐르고 기침을 자주 한다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 수면과 휴식을 취하면 완화된다고 한다. 또한 요통을 호소하나 통증 강도는 1/10 정도로 미미하다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 1/5 정도로 느낀다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중등도로 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 식욕은 보통이다. 소화는 평이하며, 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨가 보이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 12시간으로 길지만 수면의 질은 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하나 통증 강도는 미미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 104/77 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:19

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 83kg
- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

21세 남성 환자로, 6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘 악화되어 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 83kg, BMI는 29.4이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 새 카펫을 설치한 후 6일째부터 코막힘이 더욱 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 재채기를 매일 지속적으로 하고, 코 가려움이 심하여 일상생활에 불편함을 느낀다고 한다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기는 비교적 편하다고 한다. 요통은 통증 강도

3/10 정도이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

고혈압, 당뇨의 가족력이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨가 나타나며, 주간 6회, 야간 1회 정도이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 전신에 땀이 나면 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/76 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.7℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움을 4/5 정도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 크기는 대/태이다.
- 설태: 회색, 후태이다.



**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:26

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 36세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 58kg
- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

36세 남성, 1개월 전부터 알레르기비염 증상 악화 및 흑색변, 혈뇨, 다한, 오한, 기억력 저하, 피로감을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 36세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 58kg, BMI는 18.3이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기비염 증상이 시작되어 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 특히 코막힘이 심하여 코로 숨쉬기가 힘들다고 호소한다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 재채기도 빈번하게 발생한다. 발열 증상은 없으나 오한을 느끼며, 전신에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다고 한다. 또한, 흑색변과 혈뇨가

나타나고 있다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화 상태는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.4°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 피부는 각질이 있으며 건조하다. 사지무력감은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움은 없다.
- 면색: 창백

**【설진 소견】**

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 황태, 니태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:34

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 78kg
- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

21세 여성, 알레르기 비염, 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 78kg, BMI는 29.0이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)을 호소하며, 요통 (4/10) 및 소화불량 (복만/복통 4/5) 증상도 동반한다. 알레르기 비염 증상은 집 대청소 후 먼지에 노출되었을 때 악화되는 경향을 보이며, 요통은 장시간 앉아있을 때 악화된다고 한다.

## 【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

## 【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 고강도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만/복통 (4/5)을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변을 본다고 한다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 12회, 야간 3회로 잤은 편이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다고 한다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 (4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없다.
- 면색: 암색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:41

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 71kg
- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

52세 여성, 1주 전부터 발생한 알레르기비염 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 162cm, 체중은 71kg, BMI는 27.1이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 요통은 4/10 강도로 나타나며, 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아있을 때 악화되고 휴식 시 완화된다. 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 강도로 느껴진다.



## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 약물 복용 중이다(당뇨약, 이상지질혈증약).

## 【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

## 【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 한다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일 섭취, 복만/복통 (4/5)
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통
- 소변: 혈뇨, 주간 4회, 야간 2회
- 수면: 7시간, 얕은 수면, 기상 시 피로감 호소, 입면장애(1/5), 중도각성(True/5)
- 한열: 오한, 추위를 탐, 냉수 선호, 수족냉증은 없음
- 땀: 보통 땀, 두부 위주로 발한, 발한 후 피로감 및 냉함 호소
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 기억력 저하, 스트레스 대처 능력 저하, 의욕은 보통

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감 호소, 피부 건조도는 정상, 가려움증 호소, 부종은 없음, 멍들은 정상
- 면색: 암색

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 삽맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:49

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 162cm / 44kg
- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 120/분, 체온 36.0°C

## ■ 요약

14세 남환, 1주 전부터 알레르기비염 증상 (콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움), 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 162cm, 체중은 44kg, BMI는 16.8이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의 알레르기비염 증상을 호소한다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다고 한다. 재채기를 자주 하고 코막힘이 있으며 숨쉬기 약간 불편하다고 한다. 코가려움을 자주 느껴 비빈다고 한다. 요통은 통증 강도 2/10이며, 소화불량으로 복만/복통을 2/5

정도로 호소한다. 찬바람/냉기 및 과로 시 증상이 악화되고, 안정 및 수면 시 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨가 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 10시간이나, 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간/도한이 있고, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 106/69 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 36.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지무력감을 호소하며, 면색은 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 회색의 얇은 설태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:53:57

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 69kg
- 활력징후: BP 121/86 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

68세 남성 환자로 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움)과 저체온, 하지 부종, 무력감, 이명, 난청을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 69kg, BMI는 24.4이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 재채기, 콧물, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발현되었다고 한다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 호소한다. 재채기는 빈번하게

발생하며, 코가려움이 있어 자주 비비게 된다고 한다. 감기 증상으로 발열은 없으며, 오히려 35도 이하의 저체온을 보인다. 요통은 강도 1/10 정도로 경미하고, 소화불량으로 복만/복통이 1/5 정도 발생한다고 한다. 특별한 악화 요인이나 완화 요인은 없다고 한다.

**【과거력】**

이상지질혈증과 고혈압으로 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나, 소화불량을 가끔 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 4회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 무기력감을 느낀다. 기억력은 양호하다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 121/86 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.3℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하나 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황색 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:03

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 56kg
- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

16세 여성 환자로 1주 전 새 카펫 설치 후 알레르기비염 증상 악화와 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 56kg, BMI는 22.2이다.

### 【주소증】

1주 전부터 발생한 알레르기비염 증상 악화, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 설치한 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기비염 증상이 악화되었다. 특히 코막힘, 재채기, 코 가려움 증상이 심해졌으며, 콧물이 계속 흐르고 기침을 자주 한다고 호소한다. 또한, 요통과 복만, 복통을 동반한 소화불량 증상을 호소한다.

## 【과거력】

특이 약물력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 평소 운동 강도는 중등도이다. 여성력 상 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 10점 만점에 0점으로 거의 없다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이거나, 복만 및 복통을 동반한 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간 도한이 있고, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통 수준이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 부종은 없고, 멍은 정상이다.
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:11

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 59kg
- 활력징후: BP 160/100 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

42세 여성 환자로, 1주 전 황사/미세먼지 노출 후 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원함. 고혈압 가족력 있으며, 스트레스 대처 능력 저하 및 다한, 열감을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 59kg, BMI는 20.7이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전 황사/미세먼지에 노출된 후 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 증상이 발생하였다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이다. 코막힘으로 인해 숨쉬기가 불편하며, 코

가려움이 있어 자주 비빈다고 한다. 요통은 경미(통증강도 1/10)하게 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 가끔(1/5) 있다. 발열은 없고 오한은 호소하지 않는다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병, 중풍이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 높다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다(0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 가끔(1/5), 중도각성은 거의 없다(0/5).
- 한열: 평소 열감을 잘 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게(1/10) 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 160/100 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.5℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이다. 어지러움을 가끔(3/5) 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:18

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 71kg
- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

58세 남성, 3개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 71kg, BMI는 21.9이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 5일째부터 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전 사무실 이동 후 알레르기 비염 증상(재채기 발작, 심한 코막힘, 코 가려움)이 발생하여 만성적으로 악화되는 양상을 보이고 있다. 요통은 강도 3/10으로 지속되며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

## 【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 규칙적으로 시행한다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 무한(無汗) 증상이 나타난다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다고 한다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5 정도이며, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥



- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:26

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 72kg
- 활력징후: BP 117/72 mmHg, 맥박 105/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

44세 여성 환자로, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원. 환절기 기온 변화로 6일 전부터 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 72kg, BMI는 26.4이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다. 감기 증상으로는 발열이 없고 (35도 이하의 저체온), 오한은 없으며, 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 없다. 비염 증상으로는 재채기를 자주 하고, 코막힘으로 숨쉬기가 약간 불편하며, 코 가려움증이 있다. 요통은 강도 1/10이며, 소화불량으로 복만/복통이 1/5 정도 발생한다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 6일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 지속적으로 악화되고 있다. 특히 환절기에 증상이 심해지며, 수면 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움 증상을 호소한다. 요통과 소화불량도 동반되고 있다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 약물 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5
- 한열: 보통, 수족냉증은 없으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 보통, 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 1/10
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 117/72 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 36.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부가 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 창백

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:34

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 79kg
- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

49세 남성, 3개월 전 이사 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 187cm, 체중은 79kg, BMI는 22.6이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 나타났으며, 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상으로, 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 호소한다. 코 주변 피부가 헐었으며 집중이 불가능하다고 한다. 재채기를 자주 하고, 코막힘이 있어 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움으로 자주 비빈다고 한다. 또한, 요통(통증 강도 4/10)과

복만/복통(4/5)을 호소한다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 수면 및 스트레칭 시 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

음주를 자주 하며, 흡연은 25개피/일, 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 2회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 기상 시 피곤함을 느끼며, 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 절로 생기며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 大/태
- 설태: 황태, 니태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:41

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 47kg
- 활력징후: BP 135/89 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

13세 여성 환자로, 6개월 전 황사 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량, 피로감을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 47kg, BMI는 21.8이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사와 미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 황사 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되어 지속적으로 비슷한 증상을 보이다가 최근 오르내림이 있다. 주요 증상으로는 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움이 있으며, 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로



심하고, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상이다. 발열은 없으나 저체온 경향을 보인다. 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 2/5 정도로 나타난다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으며 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 3회
- 수면: 7시간, 얇은 잠을 자고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 5/5, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통으로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 135/89 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.9℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다고 호소하며, 사지무력감을 느낀다. 피부는 건조한 편이고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 박태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:50

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 80kg
- 활력징후: BP 114/78 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

44세 여성 환자로, 1개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 직장 내 사무실 이동 후 증상 발현. 오한, 콧물, 재채기, 코가려움 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 80kg, BMI는 30.1이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 7일째부터 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림을 반복한다. 찬바람이나 냉기에 노출될 경우, 습한 환경에 있을 경우 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 콧물, 재채기,

코가려움 등이 있으며, 발열은 없고 오한을 느낀다. 요통과 소화불량도 동반하고 있다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약).

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하는 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 식욕은 보통이다. 복만감과 복통을 2/5 정도로 느낀다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색, 굳기는 굳거나 경변이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 2회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도각성이 잦다 (True/5).
- 한열: 평소 오한을 잘 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며 (多汗), 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 114/78 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.3℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피로감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 부긴실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:58

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 60kg
- 활력징후: BP 106/68 mmHg, 맥박 85/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

47세 남성, 만성 알레르기 비염, 변비, 하지 부종, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 60kg, BMI는 19.6이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 변비, 하지 부종, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 7일째 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 잦은 재채기, 심한 코막힘과 코 가려움이 있으며, 요통과 소화불량을 동반한다. 습한 환경과 음주 시 증상이 악화된다고 한다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

## 【사회력】

가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 비교적 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도로, 전신에서 땀이 난다.
- 통증: 요통 강도는 4/10 이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/68 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 이다. 어지러움을 4/5 강도로 느낀다.
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회색, 膩苔

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 浮脈
- 맥폭(대세): 大脈
- 맥력: 有力
- 맥상: 緩脈
- 복합맥상: 浮大



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:07

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 58kg
- 활력징후: BP 111/72 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

15세 남성 환자로, 만성 알레르기 비염을 주소로 내원. 1년 이상 증상 지속, 새 카펫 설치 후 악화. 코막힘, 재채기, 코가려움, 맑은 수면, 변비, 잦은 소변, 야간 도한, 오한, 사지무력감, 어지럼 등을 호소.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 168cm, 체중은 58kg, BMI는 20.5이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소한다. 특히 새 카펫 설치 후 코막힘, 재채기, 코가려움 증상이 악화되었다고 한다. 발열은 없으나 오한을 느끼며, 콧물은 경미하게 나타난다. 기침은 하루 종일 지속적으로 발생한다.

요통은 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 찬바람에 노출될 경우 증상이 악화되고, 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 0회로 잤은 편이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 111/72 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.0℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명은 없다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명은 강도 1/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도로 호소한다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색이며, 크기는 크고 부어있다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:15

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 143cm / 54kg
- 활력징후: BP 149/95 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

13세 여성 환자로, 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기비염 증상을 주소로 내원함. 고혈압, 피로감, 소화불량, 수면 장애 등을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 54kg, BMI는 26.4이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 후 비염 증상(콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기)이 발생하여 지속 중이다. 콧물은 심하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편함을 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며 코 가려움증을 자주 호소한다. 요통은

경미하며(1/10), 소화불량으로 인한 복만/복통(1/5)을 호소한다. 최근 피로감을 자주 느끼며, 사지무력감을 동반한다. 수면 시간이 7시간으로 부족하지 않으나, 수면의 질이 낮고(얕음), 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다. 잠에서 깨어날 때 피곤함을 느낀다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨가 있다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중간 강도로 한다. 여성력 상 생리주기는 28일이며, 불규칙하다. 생리 기간은 0일이며, 생리통은 거의 없다(0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 복만/복통이 가끔 있다(1/5).
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 소변을 보고, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 수면, 입면장애(5/5), 중도각성(5/5).
- 한열: 평소 더위를 타거나 추위를 타는 경향은 보통이다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도로 땀이 나며, 전신에 땀을 흘린다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있다(1/10).
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 149/95 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 크기는 크다.

- 설태: 황태, 니태가 꺼 있다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:23

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 135cm / 42kg
- 활력징후: BP 110/78 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

11세 여성 환자로 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 재채기, 코막힘, 코가려움, 다한, 오한, 변비, 수면장애, 사지무력감 등의 증상을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 11세 여자 환자로 학생이다. 신장은 135cm, 체중은 42kg, BMI는 23.0이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 재채기를 자주 하고 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 매우 힘들어하며, 코가려움을 자주 호소한다. 증상은 과로 시 악화되는 경향을 보인다. 감기 증상으로 발열은 없으며, 콧물은

경미하고 기침은 하지 않는다. 요통은 통증 강도 2/10으로 경미하게 나타난다. 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 간접 흡연에 노출되지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (5/5)를 호소한다. 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 다한 증상이 있으며, 전신에서 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 2/10 강도로 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/78 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.5°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:32

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 39세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 52kg
- 활력징후: BP 114/71 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

39세 남성, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)을 호소하며 내원. 이상지질혈증 과거력, 수면 부족 및 습한 환경에 증상 악화. 흡연력 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 39세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 52kg, BMI는 15.9이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전부터 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상을 호소한다. 재채기는 빈번하게 나타나며, 코막힘으로 인해 호흡이 불편하고 코 가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받는다고 한다. 수면 부족과 습한 환경에서

증상이 악화되며, 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상은 발열, 오한은 없으며, 콧물은 중등도로 계속 흐르고, 기침은 하지 않는다. 요통은 경미하며 (2/10), 소화불량으로 인한 복만 및 복통 (2/5)을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 35개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙적이다. 소화 상태는 보통이며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨 증상이 있으며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호하고 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/71 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.9℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:40

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 79kg
- 활력징후: BP 109/77 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

50세 남성 환자로 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원함. 기존 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며 흡연력이 있음. 잦은 재채기, 코 가려움, 경미한 코막힘, 요통, 복만/복통 등을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 79kg, BMI는 23.8이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 발현되어 재채기를 자주 하고 코 가려움이 심하며, 코막힘이 약간 있다고 호소한다. 요통은 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 인해 복만/복통을 4/5 강도로 느낀다고 한다. 식이조절

시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

심장병 가족력이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 25개피/일 흡연한다. 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 및 복통을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 109/77 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 부종은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:49

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 134cm / 30kg
- 활력징후: BP 105/78 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

10세 남자 환자로, 3개월 전 새 카펫 설치 후 발생한 알레르기 비염 악화를 주소로 내원함. 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움 증상을 호소하며, 변비, 수면 부족, 다한, 오한, 사지무력감 등의 증상 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 10세 남 환자로 학생이다. 신장은 134cm, 체중은 30kg, BMI는 16.7이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환아는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움)이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 특히 콧물이 심하여 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 어려운 상태이다.



발열은 없으나 오한을 호소한다. 요통은 통증 강도 2/10으로 미미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 2/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

**【사회력】**

환아는 학생이며, 음주 및 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고 주간 9회, 야간 0회 빈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얇으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/78 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 절로 멍이 드는 증상이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:55:59

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 30세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 80kg
- 활력징후: BP 165/102 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

30세 여성 환자로, 1개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움) 및 요통, 소화불량 호소. 당뇨, 이상지질혈증 기저질환.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 30세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 80kg, BMI는 35.1이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되었다고 한다. 재채기를 자주 하고, 콧물은 계속 흘러나오는 양상이다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없다고 한다. 코 가려움은 매우 심하여 염증

소견이 보인다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다고 한다.

**【과거력】**

당뇨 및 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동은 중등도 강도로 시행하고 있다. 장시간 앉아있는 습관이 악화 요인으로 작용한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 165/102 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.8℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고, 가려움증은 없다. 사지무력감은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:07

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 34세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 60kg
- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 104/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

34세 남성 환자로, 2-3주 전 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량, 피로감, 오한 등을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 34세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 60kg, BMI는 17.9이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량, 피로감, 오한을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생하였다. 재채기는 빈번하며, 코막힘으로 숨쉬기 약간 불편함을 느끼고, 코가려움은 경미하다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로

복만/복통이 3/5 정도로 나타난다. 전반적인 증상은 현재 호전 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한, 야간/도한이 있으며, 땀 흘린 후 피곤/냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/64 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 36.6°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하나 가려움은 없다. 이명 0/5, 난청 0/5, 어지러움 1/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회색, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:15

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 33세 / 남
- 신장/체중: 190cm / 61kg
- 활력징후: BP 143/90 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

33세 남성, 3개월 전부터 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 당뇨, 가족력으로 고혈압이 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 33세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 190cm, 체중은 61kg, BMI는 16.9이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 6일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상으로 콧물, 재채기, 코막힘, 코 가려움 등을 호소한다. 콧물은 심한 편이며, 재채기는 지속적으로 나타나고, 코 가려움으로 인해 자주 코를 비빈다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 정도로 호소한다. 증상은 기름진 음식 섭취 및 스트레스에 의해 악화되는 경향을

보인다.

【과거력】

당뇨로 인해 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 143/90 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:22

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 78kg
- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 104/분, 체온 37.6°C

## ■ 요약

19세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하며, 고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 78kg, BMI는 25.5이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 콧물이 심하게 흐르고 코막힘 및 코 가려움이 동반된다고 한다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 코 주변 피부가 붉고 집중이 어려운 상태이다. 재채기를 자주 하며 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기 힘들어한다. 또한 요통 및 소화불량을 동반하며, 복만/복통은 4/5 강도로 나타난다. 휴식

및 따뜻하게 하면 증상이 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 148/98 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 37.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상
- 설태: 황태, 니태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:30

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 31세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 97kg
- 활력징후: BP 127/85 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

31세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상 (콧물, 재채기, 코가려움)과 더불어 요통, 소화불량, 변비, 혈뇨, 하지 부종, 사지무력감 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 31세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 97kg, BMI는 39.9이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상 (콧물, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 7일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 콧물은 심하며, 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 멈추지 않고 계속 흘러내린다. 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이다. 재채기는 매일

지속적으로 나타나며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬는 데는 불편함이 없다. 코가려움으로 인해 자주 비비게 되어 신경 쓰인다고 한다. 추가적으로 요통 (통증강도 1/10), 소화불량 (복만/복통 1/5), 변비, 혈뇨 증상을 동반한다.

악화 요인으로는 찬바람/냉기 노출이 있으며, 식이조절을 통해 증상 완화를 시도하고 있다.

**【과거력】**

이상지질혈증으로 진단받고 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이나 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 대변 상태는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 음료는 온수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 전신에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증강도 1/10)이 있다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 127/85 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.3℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 절로 생기는 경향이 있다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 회태, 박태



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:38

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 51kg
- 활력징후: BP 112/78 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

14세 남학생, 만성 알레르기 비염, 새 카펫 설치 후 증상 악화, 변비, 혈뇨, 수면 질 저하, 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움, 경미한 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 51kg, BMI는 18.7이다.

### 【주소증】

만성(1년 이상) 알레르기 비염을 주소로 내원하였다. 감기 증상으로는 35도 이하의 저체온, 콧물 과다, 비염 증상으로는 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움, 그리고 요통 및 소화불량 증상을 호소한다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 설치한 후 4일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 만성 알레르기 비염을 앓고 있으며, 최근 새 카펫 설치 후 증상이 악화되었다. 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움

증상을 보이며, 요통은 통증 강도 2/10으로 경미하다. 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 2/5 정도이다. 수면 시 입면장애와 중도각성이 있으며, 기상 시 피로감을 느낀다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 건망이 있다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 112/78 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 가려움증은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 활맥, 부삭맥이다.

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:46

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 58kg
- 활력징후: BP 137/87 mmHg, 맥박 89/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

15세 남학생, 1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화 및 녹색 변, 혈뇨, 야간 도한, 이명, 난청 등을 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 164cm, 체중은 58kg, BMI는 21.6이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 녹색 변, 혈뇨, 야간 도한, 이명, 난청 등을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 심해졌으며, 특히 재채기와 코막힘, 코 가려움이 심하게 나타난다. 콧물은 경미하게 흐르는 정도이다. 또한, 녹색의 묽은 변을 하루 2-3회 보며, 적색의 혈뇨 증상이 나타난다. 요통은 심하지 않으며 통증 강도는 1/10 정도이다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 1/5 정도 호소한다. 무거운 짐을 들 때

증상이 악화되는 경향이 있다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화불량을 다소 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면 장애는 5/5, 중도 각성은 0/5 이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀이 거의 없으나 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 137/87 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 36.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 관찰된다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 사지 무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:56:56

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 69세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 56kg
- 활력징후: BP 150/91 mmHg, 맥박 94/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

69세 여성 환자로, 1주 전 집 대청소 후 알레르기비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 69세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 56kg, BMI는 19.8이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 내원 1주 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 알레르기비염으로 콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기 증상을 호소한다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막히는 느낌이 있다고 한다. 재채기는 간헐적으로 발생하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하다고 한다. 코가려움으로 자주 코를 비비게 되어 신경이 쓰인다 호소한다. 또한 요통(통증 강도



2/10)과 소화불량(복만/복통 2/5)을 동반한다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다 (2/5).
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 (1/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 전신에 걸쳐 나타난다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다. 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 150/91 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 36.8°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으나 가려움은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태와 박태가 끼어 있다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:04

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 75kg
- 활력징후: BP 124/82 mmHg, 맥박 94/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

27세 남성 환자로, 6개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 알레르기 비염 증상 악화로 내원함. 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 스트레스, 찬바람, 기름진 음식에 의해 악화되고 온찜질, 스트레칭으로 완화됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 75kg, BMI는 25.1이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 재채기, 콧물 등의 알레르기 비염 증상이 발현되어 지속적으로 불편감을 호소한다. 증상은 스트레스, 찬바람/냉기, 기름진 음식 섭취 시 악화되는 경향을 보이며, 온찜질이나

스트레칭을 통해 완화되는 양상을 보인다. 현재 호전 중이라고 한다. 감기 증상으로는 발열은 없으며 저체온 증상을 보이고, 오한은 없다고 한다. 콧물은 중등도이며, 계속 흘러내리는 양상이다. 기침은 하지 않는다. 비염 증상으로는 재채기는 간헐적으로 한두 번 정도 하며, 코막힘은 양쪽 코 모두 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 매우 힘들다고 한다. 코 가려움은 약간 있다고 호소한다. 요통은 통증 강도가 1/10 정도로 미미하며, 특별한 양상은 보이지 않는다. 소화불량은 복만/복통이 1/5 정도로 경미하며, 다른 증상은 동반되지 않는다.

**【과거력】**

고혈압, 당뇨로 진단받아 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하지 않으며, 운동은 중간 강도로 꾸준히 한다고 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 양은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증은 없다. 음료는 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 전신에 땀이 난다. 땀을 흘린 후 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통이 미미하게 있다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력은 좋으나 의욕이 없는 상태이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 124/82 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 36.3°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이지만 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설이며, 크고/태가 있다.

- 설태: 백태, 박태를 보인다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:12

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 78kg
- 활력징후: BP 107/75 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

75세 남성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중임.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 170cm, 체중은 78kg, BMI는 27.0이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통(통증 강도 3/10), 소화불량(복만/복통 3/5)을 호소한다. 환절기 기온 변화로 증상이 악화되었으며, 현재 호전 중이라고 한다.

알레르기비염으로 콧물이 심하여 휴지를 자주 사용하며, 코막힘으로 숨쉬기 약간 불편하고, 코가려움이 심해 일상생활에 불편감을 느낀다고 한다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

심장병 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다. 스트레스에 노출되어 있다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 1회 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 흑색변을 2-3회/일 본다.
- 소변: 적색/혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 12시간으로 긴 편이나, 수면의 질은 얇으며, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 107/75 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.1℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:21

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 95kg
- 활력징후: BP 110/68 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

47세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원. 평소 변비와 혈뇨 증상이 있으며, 다한, 수족냉증, 얇은 수면을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 95kg, BMI는 40.1이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상을 호소한다. 특히 재채기는 지속적으로 나타나며, 코막힘으로 인해 호흡이 불편하다고 한다. 증상은 봄철 꽃가루가 날리기 시작하면서 악화되었으며,

찬바람이나 무거운 물건을 들 때 더욱 심해지는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔, 흡연은 하루 0개피, 운동은 중등도로 한다. 여성력으로 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리 기간은 0일이며, 생리통은 거의 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상이 경미하게 나타난다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황갈색, 굳기는 딱딱하다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으며(0/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 수족냉증이 있다. 음료는 따뜻한 것을 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에서 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 110/68 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.5℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움증이 있다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 소(小)하다.
- 설태: 백태, 니태(膩苔)가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 홍맥(洪脈)
- 맥력: 강력(強力)
- 맥상: 활맥(滑脈)

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:29

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 65세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 68kg
- 활력징후: BP 121/84 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

65세 여성 환자로, 3개월 전부터 발생한 알레르기 비염과 동반된 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움, 요통, 소화불량, 어지럼증, 사지무력감을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 65세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 68kg, BMI는 25.3이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이다. 재채기를 자주

하고, 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하며, 코가려움 증상으로 자주 비비게 된다. 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하다. 소화불량으로 복만 및 복통(2/5)이 있으며, 어지럼증(5/5)과 사지무력감을 호소한다. 악화 요인으로는 찬바람, 과로, 스트레스가 있으며, 특별한 완화 요인은 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 15개피/일, 운동 강도는 낮다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (강도 2/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 121/84 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.5℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다. 부종은 없고, 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:37

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 94kg
- 활력징후: BP 175/101 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

44세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 94kg, BMI는 37.7이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기 발작, 약간의 코막힘과 코가려움)을 호소한다. 감기 증상은 발열 및 오한은 없으며, 콧물이 계속 흐른다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 4/5 강도로

호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보이며, 기름진 음식 섭취 및 찬바람/냉기에 노출 시 악화되고, 휴식 및 온찜질 시 완화된다고 한다.

**【과거력】**

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 고강도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간, 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 175/101 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 부종은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 회태, 후태



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:46

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 21세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 56kg
- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

21세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원. 봄철 꽃가루 노출 후 증상 악화. 코막힘, 콧물, 재채기, 코가려움, 수족냉증, 다한 등의 증상 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 21세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 56kg, BMI는 22.7이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다. 특히 봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째부터 증상이 악화되었다고 한다.

### 【발병 에피소드】

환자는 봄철 꽃가루에 노출된 후 3일째부터 콧물, 코막힘, 재채기 등의 증상이 심해졌다고 진술하였다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 콧물, 코막힘이 주된 불편함이다. 콧물은 계속 흘러내려

휴지를 자주 사용해야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 코막힘은 양쪽 코 모두 심하여 코로 숨쉬기가 매우 힘든 상태이다. 재채기는 간헐적으로 발생하며, 코 가려움은 약간 있는 정도이다. 찬바람/냉기, 음주, 장시간 앉아있는 자세 등이 증상을 악화시키고, 스트레칭과 식이 조절이 증상 완화에 도움이 된다고 한다. 감기 증상으로 발열은 없으며, 오히려 오한을 느끼는 경향이 있다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 심장병, 중풍이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 경미하게 있다(1/5).
- 대변: 1회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있으며(1/10), 특별한 양상은 없다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.

- 설태: 백태, 다테가 껴있다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:57:54

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 51kg
- 활력징후: BP 115/74 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

75세 남성 환자로, 1주 전 직장 내 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상 악화와 소화불량, 요통을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 51kg, BMI는 19.2이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 소화불량, 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 직장 내 사무실을 이전한 후 7일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상이 악화되어 재채기, 코막힘, 코 가려움이 심해졌다고 호소한다. 특히 코막힘으로 인해 호흡이 불편하며, 코 가려움은 일상생활에 지장을 줄 정도이다. 또한, 복만감과 복통을 동반한 소화불량 증상과 함께 요통을 호소한다. 악화 요인으로는 습한 환경과 음주가 있다고 한다. 특별한 완화 요인은 없다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

## 【가족력】

가족력으로는 당뇨병이 있다.

## 【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 즐기고 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 묽거나 연변이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10 정도이다. (통증 양상 정보 없음)
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋지 않다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/74 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.9°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색이고, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백색의 얇은 설태가 덮여 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 68kg
- 활력징후: BP 133/88 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.0°C

## ■ 요약

16세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 최근 새 사무실 이동 후 증상 악화. 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움, 요통, 소화불량 등을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 68kg, BMI는 27.6이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 보였으며, 최근 새 사무실로 이동한 후 증상이 악화되었다. 콧물이 심하여 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 어려운 상태이다. 재채기를 매일 하고, 코막힘이



있어 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다. 찬바람/냉기에 노출되거나 수면 부족 시 증상이 악화되며, 식이조절 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

**【가족력】**

가족력으로 중풍이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 133/88 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.0°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 얇다.
- 설태: 회색, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:11

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 139cm / 37kg
- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

12세 여성 환자로 1년 이상 만성 알레르기비염을 주소로 내원. 봄철 꽃가루 노출 후 증상 악화되었으며, 심장병 가족력, 기름진 음식 섭취, 장시간 앉기, 흡연 등이 악화 요인으로 작용. 오한, 수족냉증, 소화불량, 얇은 수면, 안면부종, 사지무력감, 피부건조 및 가려움, 이명, 난청 등을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 여자 환자로 학생이다. 신장은 139cm, 체중은 37kg, BMI는 19.2이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 만성적으로 알레르기비염 증상을 호소한다. 특히 봄철 꽃가루에 노출된 후 재채기 발작이

심해지고 코막힘이 약간 있으며 코 가려움이 느껴진다고 한다. 감기 증상은 발열이 전혀 없고 오한 또한 없다고 한다. 콧물은 중등도로 계속 흘러나온다고 하며 기침은 하지 않는다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 3/5 정도로 느껴진다고 한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있는 경과를 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일이며, 운동 강도는 중등도이다. 여성력으로는 생리주기 28일이며, 규칙성은 확인되지 않았고, 기간은 0일, 생리통은 0/10으로 거의 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 복만/복통이 3/5 정도이다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 맑음, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간, 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 스트레스 대처력은 보통이며, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 목이 잘 들며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 느낀다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 백태, 박태이다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:20

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 185cm / 78kg
- 활력징후: BP 123/86 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.0°C

## ■ 요약

44세 남성 환자로 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화되어 내원. 환절기 기온 변화로 4일 전부터 증상 심화. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 185cm, 체중은 78kg, BMI는 22.8이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 4일 전부터 재채기, 코막힘, 코가려움 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 환절기에 증상이 심해지는 경향을 보인다. 최근 4일 동안 기온 변화가 심해지면서 재채기가 빈번해지고 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기 어려움을 느끼며, 코 가려움

또한 심해져 일상생활에 불편함을 겪고 있다. 발열 증상은 전혀 없고, 오한 또한 호소하지 않는다. 요통은 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 간헐적으로 나타난다. 휴식을 취하면 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 중강도의 운동을 규칙적으로 시행하고 있다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 자주 느낀다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 적색/혈뇨를 보이며, 주간에 9회, 야간에는 소변을 보지 않는다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗) 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다. 야간 발한은 없다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 의욕이 저하된 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 123/86 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 가려움증은 없다. 이명 강도는 5/5이며, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:29

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 38세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 79kg
- 활력징후: BP 158/98 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

38세 남성 환자로, 2-3주 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화와 함께 묽은 변, 혈뇨, 전신 부종, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 38세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 79kg, BMI는 30.9이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 묽은 변, 혈뇨, 전신 부종, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 내원 2-3주 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었으며, 재채기를 매일 지속적으로 하고 코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하다고 호소한다. 코 가려움은 약간 있으나 무시할 만한 정도이다. 또한 묽은 변을 보고 혈뇨가 있으며, 전신

부종, 2/10 강도의 요통, 2/5 강도의 복만 및 복통을 동반한 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되고, 휴식 및 수면 시 완화된다.

**【과거력】**

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력 상 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 주간에 음주를 하고, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 잘 안 되는 편이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회 소변을 보며, 적색 혈뇨가 관찰된다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번 정도이며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 158/98 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.5℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감이 있다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:37

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 97kg
- 활력징후: BP 121/86 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

56세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 알레르기비염을 주소로 내원. 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 증상 악화. 이상지질혈증 및 당뇨 기왕력, 콧물, 코막힘, 재채기, 요통 및 소화불량 호소.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 169cm, 체중은 97kg, BMI는 34.0이다.

### 【주소증】

만성적으로 1년 이상 알레르기비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소하며, 증상이 점차 악화되는 추세이다. 주 증상으로는 심한 콧물, 코막힘, 재채기, 코 가려움 등이 있다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 어려운 상태이다.

습한 환경, 찬바람/냉기, 장시간 앉아있는 자세가 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다.

**【과거력】**

환자는 이상지질혈증 및 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로는 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다. 운동강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 현재는 폐경 상태이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 규칙적으로 하며, 복만 및 복통 (3/5)을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나, 잠이 얕고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5)가 있다. 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 잘 나지 않는 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이고, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 121/86 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보인다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태 및 박태가 관찰된다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:45

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 85kg
- 활력징후: BP 111/64 mmHg, 맥박 103/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

19세 남성, 3개월 전 알레르기비염 진단 후 내원. 고혈압, 불규칙한 식습관, 흑색변, 혈뇨, 수면 질 저하, 오한, 알레르기비염 증상(콧물, 코막힘, 코가려움), 경미한 요통, 소화불량을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 85kg, BMI는 29.4이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 집 대청소 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 알레르기비염 진단 후 증상이 호전 중이다. 주 증상으로 심한 콧물, 코막힘, 코가려움이 있으며, 간헐적인 재채기를 동반한다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는

느낌이다. 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하며, 코가려움은 경미한 정도이다. 요통은 통증 강도 1/10으로 미미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 1/5 정도 발생한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 간헐적으로 발생하며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/64 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 36.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍설 또는 자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 후태가 끼 있다.

【맥진 소견】



- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:52

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 93kg
- 활력징후: BP 148/91 mmHg, 맥박 86/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

44세 남성, 만성 알레르기 비염, 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량을 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 93kg, BMI는 27.5이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 재채기, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 알레르기 비염 증상으로 재채기를 자주 하고, 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편하며, 코가려움 증상을 호소한다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이다. 소화불량으로 복만/복통이 3/5 정도 발생한다. 안정 시 완화되고, 장시간 앉아있을 시 악화된다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 진단받고 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

## 【사회력】

주간 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 3회/일 식사한다. 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 건망 증상이 있다. 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/91 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 37.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 4/5이다. 면색은 정상이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:58:59

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 84kg
- 활력징후: BP 124/87 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

68세 남성 환자로, 1년 이상 만성 알레르기 비염을 앓고 있으며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘이 심해졌다고 호소한다. 또한 혈뇨, 다한, 오한, 사지무력감, 홍조, 소화불량, 요통 등의 증상을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 84kg, BMI는 31.2이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 코막힘, 혈뇨, 다한, 오한, 사지무력감, 홍조, 소화불량, 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 앓고 있으며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘이 더욱 심해졌다. 콧물은 심하며, 휴지를 자주 사용해야 할 정도이다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코 가려움증도 호소한다. 요통은 강도 2/10

정도로 미약하게 나타난다. 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

특이사항 없음.

**【가족력】**

가족력으로 중풍이 있다.

**【사회력】**

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 깊은 수면을 취하며, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 124/87 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다. 멍은 정상적으로 나타난다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설.
- 설태: 회태, 박태.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥.

- 맥폭(대세): 홍맥.
- 맥력: 강력.
- 맥상: 활맥.
- 복합맥상: 홍대.

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:08

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 57세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 82kg
- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 99/분, 체온 38.0°C

## ■ 요약

57세 여성, 1주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움) 및 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 57세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 82kg, BMI는 32.8이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 3일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상으로 재채기를 매일 하며, 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 된다고 호소한다. 코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하며, 코 가려움증으로 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타난다. 소화불량으로 복만 및 복통이 4/5 정도로 발생한다. 찬바람/냉기, 과로, 수면 부족 시 증상이



악화된다고 한다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 적이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족 중 고혈압 환자가 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 규칙적으로 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 38.0°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고 멍이 잘 들며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 후태가 관찰된다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:16

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 62kg
- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

68세 여성 환자로, 2-3주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염을 주소로 내원. 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 증상을 호소하며, 피로감, 수면 부족, 소화불량, 요통, 전신 부종, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청, 어지러움 등을 동반함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며 혈압약을 복용 중임.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 62kg, BMI는 21.7이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염 증상을 호소한다. 재채기는 간헐적으로

나타나며, 콧물은 심하여 휴지를 자주 사용하게 된다고 한다. 코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하며, 코가려움이 심하여 일상생활에 방해를 받는다고 한다. 요통은 강도 2/10으로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 2/5 정도이다. 수면 부족이 있으며 증상이 악화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 4회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 5시간 정도 수면하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고 무기력함을 느낀다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.2℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 전신 부종과 멍이 절로 생긴다고 한다. 피부는 건조하며 각질과 가려움증이 있다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 강력이다.
- 맥상: 삼맥이며, 복합맥상은 부견실하다.

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:25

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 81kg
- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

22세 여성 환자로 만성 알레르기비염을 주소로 내원, 대청소 후 증상 악화. 흡연, 스트레스, 수면 부족이 악화 요인이며, 식이 조절 시 호전. 다한, 오한, 수족냉증을 동반하며, 소화불량과 요통을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 81kg, BMI는 28.0이다.

### 【주소증】

만성 (1년 이상) 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 만성 알레르기비염을 앓고 있으며, 주 증상으로 재채기, 코막힘, 콧물, 코가려움을 호소한다. 특히 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다고 한다. 증상은 음주, 스트레스, 수면 부족 시 악화되며,

식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

## 【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통 (4/5)을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회로 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도각성이 잦다 (True/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 (4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다. 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증을 동반한다. 멍이 잘 드는 편이다. 어지러움 (2/5)을 호소한다. 부종은 관찰되지 않는다.
- 면색: 암색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태가 관찰된다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:33

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 74kg
- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

27세 남성 환자로, 2-3주 전부터 시작된 알레르기 비염과 요통, 소화불량을 호소하며 내원하였다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 74kg, BMI는 23.9이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다. 7일 전부터 환절기 기온 변화로 인해 증상이 악화되었다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 7일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었고, 요통과 소화불량 또한 동반되기 시작했다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 (콧물, 코막힘, 코 가려움)을 호소하였다. 콧물은 심하며 계속 흘러내려

휴지를 자주 사용해야 하고, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다고 한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며 코 가려움 또한 동반된다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량 증상으로는 복만과 복통이 있으며 강도는 4/5이다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동강도는 중등도이다. 수면 부족이 증상 악화 요인이며, 안정을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.6℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:42

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 62kg
- 활력징후: BP 132/87 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

46세 남성 환자로, 1년 이상 알레르기 비염 증상과 코막힘, 콧물, 코가려움, 녹색 변, 전신 부종, 무기력, 잦은 이명과 난청, 요통, 소화불량 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 186cm, 체중은 62kg, BMI는 17.9이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염 증상 (코막힘, 콧물, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 동반 증상으로 녹색 변, 전신 부종, 무기력, 이명, 난청, 요통, 소화불량을 호소한다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 증상의 정도는 비슷하거나 오르내림이 있다. 감기 증상으로

발열은 없으나, 콧물이 심하여 휴지를 자주 사용하게 된다. 비염 증상으로 재채기는 간헐적이며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없고, 코가려움이 자주 나타난다. 요통은 통증 강도 1/10 정도로 경미하다. 소화불량으로 복만/복통이 1/5 정도로 나타난다. 증상은 과로 및 습한 환경에서 악화되는 경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병과 중풍이 있다.

**【사회력】**

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며, 수면은 깊으나 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 통증 강도 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 132/87 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도로 경미하다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(소).
- 설태: 백색의 후태가 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:50

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 63kg
- 활력징후: BP 156/92 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.4°C

## ■ 요약

19세 여성 환자로 1주 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 63kg, BMI는 24.9이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 7일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움)을 호소하며, 특히 코 가려움이 심하여 상처 및 염증이 있는 상태이다. 감기 증상으로 발열은 없으나 콧물이 심하고 간헐적인 기침이 있다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다. 찬바람/냉기 및 스트레스에 의해 증상이 악화되며, 안정 시

완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 중풍이 있다.

**【사회력】**

주간에 음주를 하며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 4회/일 하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨 또는 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋고 의욕은 높은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 156/92 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.4°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 후태

**【맥진 소견】**



- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:58

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 38세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 80kg
- 활력징후: BP 109/67 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

38세 남성 환자로, 1주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코가려움)을 호소하며, 오한, 사지무력감, 잦은 녹색변, 피로감을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 38세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 80kg, BMI는 23.6이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 (코막힘, 콧물, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상이 발현되었다. 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림이 있으며, 코막힘이 심하여 코로 숨쉬기 힘든 정도이다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코 가려움증이 있어

자주 비빈다. 飲酒, 吸煙, 濕環境에서 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 소화불량으로 복만/복통이 경미(1/5)하게 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 無汗이며, 야간에 땀이 나는 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력하고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/67 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 멍이 잘 든다. 부종은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회색 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 浮脈
- 맥폭(대세): 洪脈
- 맥력: 有力
- 맥상: 滑脈

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:06

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 81kg
- 활력징후: BP 147/94 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

30세 남성, 3개월 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 173cm, 체중은 81kg, BMI는 27.1이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 3개월 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상이 악화되어 재채기를 지속적으로 하고, 코막힘이 약간 있으며 코 가려움이 자주 발생한다고 호소한다. 요통은 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 3/5 정도이다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

## 【사회력】

환자는 음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮고, 장시간 앉아서 근무하는 습관이 있다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠을 얹게 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성도 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/94 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 느끼지 않는다(0/5).
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:15

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 68kg
- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

42세 남성 환자로, 2-3주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)이 악화되어 내원함. 과로 및 음주 시 증상 악화되며, 피로감, 전신 부종, 사지무력감, 흑색변, 혈뇨, 수족냉증을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 68kg, BMI는 20.1이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상이 발현되어 점차 악화되는 양상을 보였다. 특히 재채기와 콧물이 심하며, 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상으로 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 호소한다. 코



주변 피부가 헐었으며 집중이 불가능하다고 한다. 과로 및 음주 시 증상이 악화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 흡연은 0개피/일, 음주는 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 2/5 정도이다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통 성상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.9℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 전신 부종이 관찰된다. 피부는 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 회색의 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:23

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 50kg
- 활력징후: BP 133/82 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

20세 여성 환자로, 1개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상 및 요통, 소화불량, 피로감을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 50kg, BMI는 18.8이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상(지속적인 재채기, 코막힘, 코 가려움)이 발현되었으며, 콧물이 심하게 흘러 휴지를 자주 사용하게 된다고 호소하였다. 또한 요통 (VAS 2/10) 및 복만감, 복통 (VAS 2/5)과 같은 소화불량

증상을 호소하였다. 증상은 현재 호전 중이며, 장시간 앉아있거나 무거운 짐을 들거나 음주시 악화되는 경향을 보였다.

**【과거력】**

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력 상 고혈압 및 중풍 이력이 있다.

**【사회력】**

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피로감 및 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (VAS 2/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 133/82 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:31

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 75kg
- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

49세 남성 환자로, 3개월 전 직장 내 사무실 이전 후 발생한 알레르기비염 증상과 관련된 콧물 과다, 코막힘, 가려움, 그리고 전신 무력감, 수족냉증, 녹색변 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 75kg, BMI는 22.6이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염 증상을 주소로 내원하였다. 특히 콧물이 심하게 흐르는 증상을 호소한다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 찬바람/냉기, 스트레스, 과로 시 증상이 악화되며, 휴식과 안정을 취하면 완화된다. 특히 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울

정도이며, 코 주변 피부가 험고 집중이 불가능하다고 한다. 재채기는 간헐적으로 발생하며, 코막힘이 있고 숨쉬기가 약간 불편하며, 코 가려움은 경미하다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압과 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 특이 소화 불량 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/87 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍은 없다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기는 작다.
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:39

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 34세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 59kg
- 활력징후: BP 150/90 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

34세 여성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 환절기 기온 변화로 7일 전부터 증상 악화되었으며, 고혈압 과거력 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 34세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 59kg, BMI는 23.6이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 7일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여, 증상이 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 7일 전부터 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 증상이 악화되었다. 따뜻하게 하면 증상이 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상으로 발열은 없으며,

오한 증상 또한 없다.

**【과거력】**

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에는 보지 않는다. 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이며, 수면의 질은 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5) 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 150/90 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.2℃, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며, 얇게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:48

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 67kg
- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

44세 여성 환자로, 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 주소로 내원. 최근 환절기 기온 변화로 증상 악화되었으며 스트레스와 과로가 악화 요인으로 작용.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 67kg, BMI는 24.0이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 3일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 최근 3일 전부터 증상이 악화되었다. 환자는 재채기를 자주 하고, 콧물이 멈추지 않아 휴지를 자주 사용하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기가

약간 불편하다고 호소한다. 또한 코가려움 증상으로 자주 비비게 된다. 요통은 강도 1/10으로 미미하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 1/5 정도로 나타난다. 스트레스와 과로 시 증상이 악화되며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 굳고 딱딱하다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간에 땀을 많이 흘리고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:56

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 38세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 69kg
- 활력징후: BP 108/70 mmHg, 맥박 57/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

38세 남성 환자로 3개월 전부터 시작된 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 38세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 69kg, BMI는 24.2이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 새로 이사한 집에서 2일간 거주 후 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)이 발현되었다고 한다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 코막힘으로 인해 호흡이 다소 불편하다고 호소한다. 또한 요통(통증 강도 4/10)과 복만 및 복통(강도 4/5)을 동반한 소화불량 증상을 호소한다. 스트레스 시 증상이 악화되며,

스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동강도는 높다고 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 보통의 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다고 한다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 요통 (4/10)과 복통 (4/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 높으나, 스트레스 대처 능력은 보통이라고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 108/70 mmHg, 맥박 57회/분, 체온 36.6℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 작다.
- 설태: 회색, 니태가 낫다.



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:03

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 76세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 56kg
- 활력징후: BP 119/71 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

76세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 봄철 꽃가루 노출 후 증상 악화. 과거력 및 약물력은 특이사항 없음. 스트레스, 음주, 흡연이 증상 악화 요인.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 76세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 173cm, 체중은 56kg, BMI는 18.7이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 봄철 꽃가루에 노출 시 재채기, 콧물, 코 가려움 등의 증상이 심해진다고 호소한다. 최근 2일간 꽃가루 농도가 높아지면서 증상이 악화되어 내원하였다. 온찜질과 식이조절

시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

### 【과거력】

특이 과거력은 없다.

### 【가족력】

특이 가족력은 없다.

### 【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 중간 정도이다.

### 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색이고, 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

### 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/71 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.7°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감이 있다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 정상이다.

### 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:12

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 84kg
- 활력징후: BP 116/71 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

45세 남성 환자로, 6개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 함께 요통, 소화불량, 어지러움, 사지무력감, 수면장애, 오한, 건조/가려움증을 호소한다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 84kg, BMI는 28.4이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량, 어지러움 등을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 재채기, 콧물 증상이 발생하여 지속적으로 나타나고 있다.

코막힘과 코가려움 증상도 동반하며, 요통과 소화불량 증상도 함께 호소한다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량은 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다. 감기 증상으로 발열은 없으며 저체온 경향을 보이고, 오한을 호소한다. 콧물은 경미하며, 기침은 간헐적으로 나타난다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없으며, 코가려움으로 자주 비빈다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

## 【가족력】

심장병 가족력이 있다.

## 【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 0개피/일이며, 운동 강도는 낮다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통으로 땀을 흘리며, 두부에서 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/71 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.2°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀가 얇다(小).

- 설태: 회색 설태가 두껍게 덮여있다(厚).

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:19

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 63kg
- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

46세 여성 환자로, 1주 전 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)을 호소하며 내원함. 동반 증상으로 오한, 요통, 소화불량, 어지러움, 사지무력감, 이명, 난청 등을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 63kg, BMI는 26.2이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

1주 전 친구 집 방문 후 재채기, 코막힘, 코가려움이 발생하였으며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 코막힘으로 숨쉬기가 약간 불편하고, 코가려움이 심하여 일상생활에 불편감을 느낀다. 재채기를 자주 한다. 요통은 강도



1/10 정도이다. 소화불량으로 복만 및 복통이 경미하게 나타난다.

## 【과거력】

특이사항 없음.

## 【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

## 【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.1°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 암색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小(소)
- 설태: 황색, 니태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:27

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 48kg
- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.4°C

## ■ 요약

15세 남학생, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 콧물, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량, 다한, 피로감, 수면장애, 전신 부종 등을 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 48kg, BMI는 19.0이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 콧물, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여, 봄철 꽃가루가 날리는 시기에 악화되는 경향을 보인다. 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 불가능하다고 호소한다.

코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하며, 코 가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받는다고 한다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 3/5 정도이다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다. 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:37

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 54kg
- 활력징후: BP 102/71 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

16세 남성 환자로, 1개월 전 새 카펫 시공 후 발생한 알레르기비염 증상과 잦은 콧물, 야간뇨, 무력감, 코막힘, 콧물 과다, 잦은 재채기 등을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 174cm, 체중은 54kg, BMI는 17.8이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상(주로 심한 콧물, 코막힘, 재채기)을 주소로 내원하였다. 요통 및 소화불량(복만, 복통)을 동반한다.

### 【발병 에피소드】

환자는 1개월 전 새 카펫을 시공하였고, 5일 후부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 새 카펫 시공 후 알레르기비염 증상이 발현되었다. 콧물이 매우 심하여 휴지로 감당하기 어려울

정도이며, 코 주변 피부가 헐어 있다. 재채기를 지속적으로 하고, 코막힘으로 숨쉬기 불편함을 느낀다. 요통은 4/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 증상은 수면 및 따뜻하게 함으로써 완화된다. 발열 증상은 없으며, 오히려 저체온 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽은 변/연변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 5회로 잦은 빈뇨를 보인다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 무기력함을 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 102/71 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:45

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 68kg
- 활력징후: BP 155/98 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

42세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원하였다. 고혈압 및 심장병 가족력이 있으며, 잦은 음주 습관이 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 68kg, BMI는 25.0이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움) 및 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 콧물, 재채기, 코가려움이 나타난다. 특히 콧물이 심하여 휴지를 자주 사용하게 된다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만감과 복통이 3/5 정도로 나타난다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

## 【사회력】

직업은 사무직이며, 음주를 자주 하는 편이다. 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 높은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처는 잘 하는 편이나 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/98 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 들고 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 백태, 니태가 끼어 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥, 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:53

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 84세 / 남
- 신장/체중: 165cm / 79kg
- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

84세 남성 환자로, 3개월 전 반려동물 접촉 후 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 84세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 79kg, BMI는 29.0이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 알레르기 비염 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

알레르기 비염 증상으로 콧물이 심하게 흐르며, 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 호소한다. 코 주변 피부가 빨갛으며 집중이 어렵다고 한다. 재채기는 간헐적으로 한두 번 정도이며, 코막힘이 있고 숨쉬기 약간 불편함을 느낀다고 한다. 코 가려움증이 있어 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

## 【사회력】

매일 음주를 하며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 높은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 9회, 야간에 1회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/98 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며 피부가 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 황색

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:03

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 95kg
- 활력징후: BP 135/84 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

20세 여성 환자로, 3개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 직장 내 사무실 이동 후 증상 발현됨. 평소 소화불량과 피로감을 느낌.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 95kg, BMI는 34.1이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 5일째 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기비염 증상이 발생하여 지속적으로 불편함을 느끼고 있다. 증상은 호전 중이나 재채기 발작이 만성적으로 나타나고, 코막힘은 경미하며 코가려움증도 약간 있다. 발열은 없으나 저체온

경향을 보이며, 오한 증상 또한 호소하지 않는다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며 기간은 6일이다. 생리통은 거의 없다(0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만/복통은 1/5 정도로 경미하게 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않는 무한(無汗)이며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 135/84 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명은 거의 없으며(0/5), 난청은 경미하다(1/5). 어지러움은 없다(0/5).
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색으로 정상이다.
- 설태: 회백색의 얇은 설태가 있다.



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:10

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 65kg
- 활력징후: BP 153/90 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

51세 여성, 1주 전부터 알레르기비염 증상 및 요통, 소화불량을 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 65kg, BMI는 23.6이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었으며, 요통은 강도 3/10으로 지속되고 있다. 소화불량으로 인한 복만/복통은 3/5 정도로 불편감을 호소한다. 스트레칭 및 온열찜질 시 증상 완화된다고 한다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 여성력 상 생리주기는 28일이며, 폐경 상태이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량으로 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며(無汗), 야간에 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/90 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.3°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 절로 멍이 잘 든다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:18

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 65kg
- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

18세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (주로 재채기, 코막힘, 코가려움), 만성적인 재채기 발작, 2/10 강도의 요통, 2/5 강도의 복만/복통을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 171cm, 체중은 65kg, BMI는 22.2이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기 비염 증상이 발현되었다고 한다. 주 증상으로는 재채기 발작, 경미한 코막힘과 코가려움이 있으며, 만성적인 재채기가 주된 불편감이라고 호소한다. 요통은 통증 강도 2/10으로 나타나며,

소화불량으로 인한 복만/복통은 2/5 강도로 나타난다. 안정 및 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로는 고혈압과 당뇨가 있다.

**【사회력】**

주간에 음주를 하며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동은 중등도 강도로 규칙적으로 하고 있다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이며, 특별한 소화불량이나 오심/구토 증상은 호소하지 않는다.
- 대변: 1회/일, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질은 낮다고 호소한다. 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)이 있다. 기상 시 개운함을 느낀다고 한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에서 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다. 복만/복통 강도는 2/5이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력함을 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.9℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:25

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 45kg
- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

12세 남학생, 1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화로 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 남 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 45kg, BMI는 20.3이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 6일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환아는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 나타나기 시작했으며, 특히 꽃가루가 날리는 시기에 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 재채기, 코막힘, 코 가려움 등이 있다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐르는 양상을 보인다. 기침은 동반되지 않는다.



## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

## 【가족력】

가족력 상 고혈압력이 있다.

## 【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하고 있다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 한다. 소화불량 증세는 경미하며, 복만/복통은 1/5 정도로 나타난다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 1회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10으로 경미하며, 특별한 통증 양상은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.9°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰된다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도로 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:34

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 37세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 79kg
- 활력징후: BP 150/97 mmHg, 맥박 107/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

37세 남성, 6개월 전부터 알레르기 비염 증상 호소, 새 카펫 설치 후 증상 악화. 고혈압 병력, 매일 음주 및 흡연, 변비, 다한, 수면 부족, 홍조, 부맥, 홍맥, 활맥 등의 소견.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 37세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 79kg, BMI는 30.9이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 4일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기비염 증상을 보이며, 코막힘, 콧물, 코가려움 등을 호소한다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상을 보이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 어려운 상태이다. 재채기는 간헐적으로 나타나고, 코막힘은

심하지 않으나 코 가려움이 있어 자주 비비는 경향이 있다. 요통은 강도 3/10이며, 복만/복통은 3/5 정도로 나타난다. 안정 및 휴식 시 증상 완화된다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하고, 35개피/일 흡연한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 특이 소화기 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/97 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 36.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명은 0/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:43

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 69kg
- 활력징후: BP 173/100 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

63세 남성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원. 고혈압 및 심장병 가족력, 흡연력 있으며, 변비, 수면 장애, 다한, 하지 부종, 사지 무력감 등을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 69kg, BMI는 23.6이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상을 호소하였다. 특히 재채기는 빈번하게 발생하며, 코막힘은 경미한 수준이나 코가려움은 신경 쓰이는 정도이다. 증상 호전과 악화에 영향을 주는 요인으로

기름진 음식 섭취와 무거운 짐을 드는 행위가 있다고 진술하였다. 감기 증상으로 발열, 오한은 없으며 콧물은 경미하고 기침은 없다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 현재 복용 중인 약물은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중등도 강도로 꾸준히 하고 있다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애(5/5)와 중도 각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 진술하였다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 173/100 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:50

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 72kg
- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

21세 여성 환자로, 사무직에 종사하며 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다. 직장 내 사무실 이동 후 증상이 시작되었으며, 피로감, 잦은 재채기, 코 가려움, 전신 부종, 사지 무력감 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 72kg, BMI는 24.9이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새로운 사무실로 이동한 후 6일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 사무실 이동 후 재채기 발작, 코 가려움, 경미한 코막힘 등의 비염 증상이 발생하였다. 증상은 만성적으로 지속되며, 간헐적으로 증상의 정도가 오르내림이 있다고 한다. 동반 증상으로는 전신 부종, 사지 무력감,

가려움증, 이명, 어지러움 등이 있다. 감기 증상으로는 발열 및 오한은 없으며, 콧물이 지속적으로 흐른다고 호소한다. 과거 당뇨 진단을 받았으며, 현재 당뇨약을 복용 중이다.

【과거력】

당뇨 진단을 받고 당뇨약 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 0/10으로 경미하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화 불량 증상으로 복만 및 복통이 1/5 정도 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면 장애 (5/5) 및 중도 각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통은 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력감을 느낀다고 한다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:58

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 55kg
- 활력징후: BP 173/109 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

50세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염 증상 악화와 함께 흑색변, 잦은 소변, 피로감, 수족냉증 등을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 55kg, BMI는 18.0이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원하였다. 환절기 기온 변화가 심해지면서 6일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 6일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다. 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 증상을 호소한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 특히 환절기 기온 변화에 민감하게 반응하며, 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 증상을 호소한다. 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하고 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중등도로 꾸준히 하고 있다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 가끔 호소한다. 복만감 및 복통은 경미한 정도 (1/5)이다.
- 대변: 1일 2-3회 흑색 변을 보며, 뭉거나 연변의 형태를 띈다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이지만, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 야간에 도한이 있으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 간헐적으로 호소하며, 통증 강도는 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 나쁜 편이다. 의욕은 높은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 173/109 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 경미한 정도 (1/5)이다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:06

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 56세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 87kg
- 활력징후: BP 107/65 mmHg, 맥박 66/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

56세 여성 환자로, 만성 알레르기비염을 주소로 내원. 새 카펫 설치 후 증상 악화. 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 있으며, 오한, 사지무력감, 변비, 수면불량, 무한 등의 증상 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 56세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 87kg, BMI는 36.2이다.

### 【주소증】

만성 (1년 이상) 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소하며, 최근 새 카펫 설치 후 코막힘이 더욱 심해졌다고 한다. 재채기를 자주 하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편함을 느끼고, 코 가려움이 간헐적으로 나타난다. 찬바람에 노출 시 증상이

악화되며, 휴식 시 증상이 완화된다고 한다. 발열은 없으나 오한을 느끼며, 콧물은 중등도로 지속적으로 흐르는 양상을 보인다. 요통은 경미하며(2/10), 소화불량으로 인한 복만/복통(2/5)을 호소한다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 여성력 상, 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 현재는 Menopause 상태이다.

**【가족력】**

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 음주는 가끔, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 종종 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질은 깊으나, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 자주 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 열수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에만 땀이 약간 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 간헐적으로 발생하며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 107/65 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다(0/5).
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.



- 설태: 백태, 다테가 있다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:14

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 68kg
- 활력징후: BP 107/62 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

19세 여성 환자로, 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며 내원. 과거력 상 당뇨 및 이상지질혈증 존재. 최근 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 증상 악화됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 68kg, BMI는 27.9이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염을 주소로 내원하였다. 증상은 오르내림을 반복한다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소한다. 주 증상으로는 재채기 발작, 코막힘, 코 가려움이 있다. 특히 친구 집 방문 후 증상이 악화되었으며, 과로 시에도 증상이 심해지는 경향을 보인다. 휴식 시 증상이 다소 완화된다고

한다.

## 【과거력】

과거력 상 당뇨 및 이상지질혈증 진단을 받았으며, 현재 당뇨약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력 상 당뇨 및 심장병력이 있다.

## 【사회력】

음주를 자주 하는 편이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 거의 없다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 편이며, 전신에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다. 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/62 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 어지러움을 4/5 정도로 호소하며, 이명 강도는 4/5, 난청은 없다. 면색은 정상이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 후태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:22

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 49kg
- 활력징후: BP 101/83 mmHg, 맥박 103/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

13세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 환절기 기온 변화와 함께 5일 전부터 증상이 악화됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 49kg, BMI는 21.8이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 호소하였다. 특히 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 코 가려움은 신경 쓰일 정도로 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타났으며, 소화불량으로

인한 복만/복통은 4/5 수준이다. 장시간 앉아있거나 찬바람, 습한 환경에 노출 시 증상이 악화되며, 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 101/83 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 36.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:32

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 67kg
- 활력징후: BP 114/74 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

19세 남성 환자로, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상과 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 묽은 비, 잦은 소변, 피로감 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 67kg, BMI는 22.6이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다. 재채기, 코막힘, 코 가려움 등의 증상을 호소한다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 시작되어 점차 악화되는 양상을 보인다. 주요 증상으로는 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움 등이 있으며, 이로 인해 일상생활에 불편함을 느끼고 있다. 감기 증상은 발열은 없으나,



콧물이 계속 흐르는 증상이 있다. 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하다. 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨의 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙적이며, 소화는 보통이다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변의 양상이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 5회로 잦은 편이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 전신에 땀이 나지 않는다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁜 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/74 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.1℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 소(小)

- 설태: 백태, 후태

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:41

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 69kg
- 활력징후: BP 107/77 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

18세 여성 환자로, 3개월 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 170cm, 체중은 69kg, BMI는 23.9이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되었으며, 이후 증상이 악화되는 추세이다. 주 증상으로는 빈번한 재채기, 코막힘 (숨쉬기 약간 불편), 심한 코가려움 등이 있다. 또한 요통 (통증 강도 4/10)과

복만/복통 (4/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 음주, 과로, 습한 환경에서 증상이 악화되며, 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 여성력 상 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다 (0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회, 적색/혈뇨를 보인다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)과 복통 (4/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 107/77 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 경미하다 (1/5).
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 백태, 박태를 보인다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:50

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 144cm / 43kg
- 활력징후: BP 141/98 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

11세 여성 환자로, 6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원. 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 증상 시작됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 11세 여자 환자로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 43kg, BMI는 20.7이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 악화 요인으로 스트레스, 무거운 짐을 드는 행위, 장시간 앉아 있는 자세 등이 있다. 특별한 완화 요인은 없다.

## 【과거력】

특이 약물력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 10점 만점에 0점이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 규칙적이다. 특별한 소화 불량은 없으나, 복만감 및 복통이 1/5 정도 느껴진다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 없다.
- 한열:惡寒을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 盜汗이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으며, 의욕은 높은 편이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 141/98 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.9°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백한 편이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 붉고 자줏빛을 띠며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 얇게 덮여 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 浮脈
- 맥폭(대세): 洪脈
- 맥력: 有力
- 맥상: 滑脈



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:58

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 70kg
- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

68세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움 증상을 호소하며, 요통 및 소화불량 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 70kg, BMI는 23.4이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 3일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 주 증상으로는 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움이 있으며, 특히 재채기가 빈번하고 코막힘으로 인한 호흡 불편감과 코가려움이 심하다고 호소한다.

감기 증상으로는 발열은 없으며 오히려 저체온 경향을 보이고, 오한 증상은 없다. 요통은 강도 2/10으로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다. 장시간 앉아있거나, 수면 부족, 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 식이 조절과 충분한 수면을 취할 때 증상이 완화된다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중등도 강도로 규칙적으로 하고 있다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 5회 정도 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 높은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:07

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 73세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 93kg
- 활력징후: BP 106/73 mmHg, 맥박 104/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

73세 여성 환자로, 1개월 전부터 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 73세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 93kg, BMI는 37.7이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (지속적인 콧물, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 비염 증상이 나타나기 시작했으며, 콧물, 재채기, 코막힘, 코 가려움 증상을 호소한다. 특히 콧물이 심하여 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 요통은

4/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5 강도로 나타난다. 무거운 짐을 들거나 수면이 부족할 경우 증상이 악화되며, 따뜻하게 하거나 스트레칭을 하면 증상이 완화된다고 한다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받고 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 심장병이 있다.

**【사회력】**

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에는 4회, 밤에는 0회 소변을 보며, 색은 황색이다.
- 수면: 5시간 정도 잠을 자며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 더운 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 106/73 mmHg, 맥박 104회/분, 체온 36.6℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태가 관찰된다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:14

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 73kg
- 활력징후: BP 105/71 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

24세 여성 환자로, 3개월 전 집 대청소 후 악화된 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 73kg, BMI는 30.4이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움이 심하다고 한다. 재채기는 지속적으로 나타나며, 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용한다. 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움이 심해 일상생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 3/10 정도로 나타나며, 소화불량으로 복만

및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 증상은 과로 시 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

## 【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

## 【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 규칙적으로 한다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 3/5.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 5회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움을 느낌. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탐. 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통, 전신 발한, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낌.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 좋은 편이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/71 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움을 5/5 정도로 호소한다.
- 면색: 창백

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 니태

## 【맥진 소견】



- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:21

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 73kg
- 활력징후: BP 105/73 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

19세 남성, 만성 알레르기 비염, 잦은 재채기, 코 가려움, 묽은 비, 잦은 소변, 수족냉증, 피로감, 어지러움 등을 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 73kg, BMI는 22.5이다.

### 【주소증】

만성(1년 이상) 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 3일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

환자는 알레르기 비염 증상으로 재채기를 자주 하며, 코 가려움이 매우 심하고, 코막힘이 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없다고 한다. 또한, 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

## 【과거력】

이상지질혈증.

## 【가족력】

특이 가족력은 없다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다. 장시간 앉아있는 습관이 있으며, 휴식을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 복만, 복통을 3/5 정도로 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽은 변/연변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타난다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 높다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/73 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도가 높고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:28

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 70kg
- 활력징후: BP 105/73 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

44세 여성 환자로, 1년 이상 만성 알레르기비염을 주소로 내원하였다. 환절기 기온 변화로 6일 전부터 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 169cm, 체중은 70kg, BMI는 24.5이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 6일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 알레르기비염 증상으로 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없다. 코 가려움증을 자주 호소한다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 3/5 강도로 호소한다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 붉은색 혈뇨를 보이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없고, 중도각성도 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕은 보통 수준이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/73 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움증은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 1/5 수준이다. 어지러움은 3/5 강도로 호소한다.
- 면색: 정상이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태이며, 박태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:37

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 73kg
- 활력징후: BP 112/75 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

68세 여성 환자로 1주 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원함. 과거력 상 고혈압 및 당뇨 가족력이 있으며, 스트레스 시 증상 악화, 스트레칭 및 온열 시 완화되는 경향을 보임. 알레르기 비염 증상과 함께 요통 및 소화불량 증상을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 73kg, BMI는 28.5이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 4일째 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 나타났으며, 봄철 꽃가루에 노출된 후 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는



재채기, 코막힘, 코 가려움이 있으며, 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보인다. 동반 증상으로 요통 및 복만, 복통을 호소한다. 스트레스 시 증상이 악화되며, 스트레칭 및 온열 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력 상 고혈압 및 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5)가 있다. 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 112/75 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설, 태설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:46

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 47세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 48kg
- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 120/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

47세 남성 환자로, 6개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)을 호소하며 내원. 고혈압 병력 있으며, 다한, 수족냉증 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 47세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 48kg, BMI는 14.5이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 4일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 6개월 전 이사 후 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발생하였다고 한다. 증상은 지속적으로 나타나며, 찬바람/냉기에 악화되고 온찜질 및 스트레칭으로 완화된다고 한다. 콧물은 멈추지 않고 계속

흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다고 호소한다. 재채기를 자주 하고, 코막힘이 있으며 숨쉬기 약간 불편하고, 코가려움이 있어 자주 비빈다고 한다. 현재 호전 중이다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. (0개피/일) 운동강도는 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 특이 소화기 증상은 없다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 5시간 수면을 취하며, 잠이 얕고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 나타나며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으며, 의욕은 높다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/74 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 36.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 5/5, 난청은 4/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:53

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 50kg
- 활력징후: BP 133/83 mmHg, 맥박 74/분, 체온 36.0°C

## ■ 요약

59세 남성 환자로, 1주 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화되어 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 당뇨가 있으며, 피로감, 오한, 소화불량, 하지 부종, 흑색변, 잦은 소변, 기억력 저하, 무기력, 사지무력감, 홍조 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 50kg, BMI는 16.1이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화를 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 1주 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전 집 대청소 후 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 악화되었으며, 따뜻하게 하거나 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상으로는 발열은 없으며, 콧물이 계속 흐른다고 한다. 요통은 통증 강도

4/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 호소한다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 당뇨로 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

## 【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통은 4/5 정도이다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10 이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/83 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 36.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 후태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:01

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 23세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 58kg
- 활력징후: BP 105/79 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

23세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다. 콧물, 재채기, 코막힘 등의 증상을 호소하며, 특히 콧물이 심하여 일상생활에 불편함을 느끼고 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 23세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 58kg, BMI는 21.6이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

6개월 전 친구 집 방문 후 콧물, 재채기, 코막힘 등의 증상이 발생하여 지속 중이다. 콧물이 심하게 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 불가능하다고 호소한다. 재채기는 지속적으로 나타나며,

코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다. 요통은 강도 1/10로 경미하며, 복만/복통은 1/5 정도로 가끔 나타난다. 증상의 정도는 비슷하거나 오르내림이 있다. 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

**【과거력】**

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

**【가족력】**

중풍 가족력이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 장시간 앉아 있는 것과 수면 부족이 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화 상태는 보통이며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 경미한 수준이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 건망이 있는 편이다. 의욕은 높은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/79 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:08

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 56kg
- 활력징후: BP 116/69 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

48세 여성 환자로, 3개월 전 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 발생한 알레르기비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 56kg, BMI는 21.3이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(심한 콧물, 지속적인 재채기, 코막힘, 경미한 코 가려움)이 발생하였다. 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 불가능하다고

호소한다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량은 복만/복통 4/5로 나타난다. 현재 증상은 호전 중이라고 한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 높다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질은 양으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에서 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 116/69 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.6°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 든다고 호소한다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있으나 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 후태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:16

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 70kg
- 활력징후: BP 123/80 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

67세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기비염 증상을 주소로 내원함. 과거력으로 이상지질혈증이 있으며, 가족력으로 당뇨가 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 70kg, BMI는 26.3이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 3일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기비염 증상을 호소한다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐르며, 재채기를 자주 하고 코 가려움을 호소한다. 코막힘은 경미한 수준이다. 동반되는 증상으로 2/10 강도의 요통과 2/5 강도의 복만/복통을

호소한다. 안정 및 식이조절 시 증상이 완화된다.

**【과거력】**

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

**【가족력】**

당뇨 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하다.
- 대변: 1회/일, 황색 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 2회, 황색 뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 123/80 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 생긴다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 니태

**【맥진 소견】**



- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:23

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 84kg
- 활력징후: BP 105/71 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

40세 여성, 1개월 전 황사 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)과 저체온, 요통, 소화불량을 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 84kg, BMI는 33.6이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움), 저체온, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사와 미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 황사 심한 날 외출 후 갑작스럽게 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기비염 증상이 발생하였다. 콧물은 경미하나, 재채기는 지속적으로 나타나고 코막힘은 숨쉬기 불편할 정도로 심하며, 코가려움 또한

일상생활에 지장을 줄 정도로 심하다고 한다. 감기 증상으로 발열은 전혀 없으며 오히려 저체온을 보인다. 요통은 강도 1/10으로 경미하며, 소화불량으로 복만감과 복통을 1/5 정도로 느낀다고 한다. 완화 요인으로는 수면 및 따뜻하게 하는 것이 있으며, 악화 요인은 특별히 언급하지 않았다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 35일로 불규칙하며, 기간은 6일, 생리통은 3/10 정도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 복만감과 경미한 복통이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색의 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕은 보통, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/71 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하며, 멍은 없다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:31

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 53kg
- 활력징후: BP 179/101 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

48세 여성 환자로, 직장 내 사무실 이전 후 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 53kg, BMI는 22.6이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 직장 내 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코 가려움), 요통, 소화불량(복만, 복통)이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 알레르기 비염 증상으로 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 코막힘으로 인한 호흡 불편감과 심한 코 가려움으로 일상생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 3/10 정도로 지속적으로

나타난다. 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 3/5 정도로 불편감을 호소한다. 증상은 무거운 짐을 들거나 기름진 음식을 섭취했을 때 악화되며, 휴식을 취하거나 스트레칭을 할 때 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하고, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 여성력으로는 생리주기 22일로 규칙적이며, 생리 기간은 0일, 생리통은 0/10이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에 2회 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한이 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕이 저하된 상태이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 179/101 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.9℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상이다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:38

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 67kg
- 활력징후: BP 126/80 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

16세 여성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기)을 주소로 내원. 요통 및 소화불량 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 164cm, 체중은 67kg, BMI는 24.9이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기)을 주소로 내원하였다. 요통 및 소화불량 증상도 호소한다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발현되었다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이 있다. 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느끼며, 재채기를 자주 한다. 요통은 통증 강도 2/10 정도이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도 호소한다. 증상은 비슷하게 지속되거나



오르내림이 있다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피, 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 126/80 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.7°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 절로 멍이 드는 경우가 있다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:46

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 72kg
- 활력징후: BP 163/105 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.0°C

## ■ 요약

56세 남성 환자로 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화와 함께 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 72kg, BMI는 22.7이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 집 대청소 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 대청소 이후 먼지에 노출되면서 재채기, 코막힘, 코 가려움이 심해졌다. 콧물은 지속적으로 흐르며 휴지를 자주 사용해야 할 정도이다. 요통은 강도 2/10으로 나타나며,

소화불량으로 인한 복만감과 복통이 2/5 정도로 느껴진다고 한다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 충분한 수면을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 35개피/일 정도이며, 운동은 거의 하지 않는다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하된 상태이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 163/105 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지럼증은 경미하게 나타난다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:53

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 65kg
- 활력징후: BP 153/92 mmHg, 맥박 80/분, 체온 35.0°C

## ■ 요약

16세 여성 환자로 6개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화를 주소로 내원. 집 대청소 후 증상 악화되었으며, 과로, 냉기, 흡연에 의해 악화되고 안정과 휴식으로 완화됨. 저체온, 재채기 발작, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량, 무한, 사지무력감, 이명, 난청, 홍조 등의 증상 호소.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 65kg, BMI는 25.4이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 추세이다. 특히

재채기 발작, 코막힘, 코 가려움이 심하며, 요통과 소화불량도 동반되고 있다. 과로, 찬바람/냉기, 흡연에 의해 증상이 악화되고, 안정과 휴식으로 증상이 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0개피를 피우며, 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일이며 불규칙하고, 기간은 0일, 생리통은 0/10이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙적이며, 복만/복통을 4/5로 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 깊은 잠을 자지만 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이며, 냉수를 선호하고 수족냉증은 없다. 저체온 증상을 보인다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 153/92 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 35.0℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:01

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 36세 / 여
- 신장/체중: 161cm / 81kg
- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

36세 여성, 알레르기비염, 당뇨병, 만성 피로, 흑색변, 수족냉증, 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 36세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 81kg, BMI는 31.2이다.

### 【주소증】

만성(1년 이상) 알레르기비염, 피로, 소화불량을 주소로 내원하였다. 환자는 재채기, 코막힘, 코가려움 증상을 호소한다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 알레르기비염 증상으로 재채기를 매일 하고, 코막힘이 있어 숨쉬기 약간 불편하며, 코가려움증을 자주 호소한다. 증상은 지속적으로 악화되는 추세이며, 기름진 음식을 섭취 시 악화되고, 온찜질 및 식이조절 시 다소 완화된다고 한다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 1/5 정도로 호소한다.

## 【과거력】

당뇨병으로 약물 복용 중이다.

## 【가족력】

특이 가족력은 없다.

## 【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 굳고 딱딱하다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀이 잘 나지 않으며 (無汗), 특히 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕은 높고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/74 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.6°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다고 호소하며, 사지무력감을 느낀다. 피부는 건조하지 않으나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청 2/5, 어지럼증은 없다.
- 면색: 암색

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크고 붓고 (대/태)
- 설태: 백태, 얇게 끼어있다(박태).

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:08

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 32세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 79kg
- 활력징후: BP 110/72 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

32세 여성, 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 32세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 79kg, BMI는 32.0이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 4일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 재채기를 매일 하고, 코막힘이 약간 있으나 코로 숨쉬기 편하며, 코가려움으로 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 복만/복통을 3/5 강도로 호소한다. 기름진 음식을 섭취하면 증상이 악화된다.

## 【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

## 【사회력】

비음주자이며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통으로, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/72 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:16

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 25세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 96kg
- 활력징후: BP 118/71 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

25세 여성 환자로, 1개월 전 반려동물 접촉 후 알레르기 비염 증상과 소화불량, 요통을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 25세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 166cm, 체중은 96kg, BMI는 34.8이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코 가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발생하여 지속적으로 재채기, 경미한 코막힘, 코 가려움을 호소한다. 요통은 강도 3/10으로 나타나며, 복만 및 복통은 3/5 강도로 발생한다. 스트레칭과 온열요법으로 증상이 완화된다고 한다.

## 【과거력】

이상지질혈증으로 진단받아 약물을 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 저강도로 한다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 0점이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (3/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/71 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소하고 면색은 창백하다.
- 면색: 창백

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설
- 설태: 백태, 후태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥



- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:23

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 157cm / 49kg
- 활력징후: BP 140/98 mmHg, 맥박 102/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

13세 남자 환자로, 1년 이상 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소한다. 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 증상 발현. 고혈압 및 당뇨 가족력.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 남자 환자로 학생이다. 신장은 157cm, 체중은 49kg, BMI는 19.9이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 감기 증상으로 발열은 없으나 콧물과 빈번한 기침이 있다. 비염 증상으로 재채기를 자주 하고, 코막힘으로 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움이

심해 일상 생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 4/10 정도이며, 소화불량으로 복만/복통을 4/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회.
- 수면: 7시간, 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀은 전신에 무한(無汗)이며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (통증 강도 4/10).
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 사지 무력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋은 편이며, 의욕은 높다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 140/98 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 37.3℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 각질이 있고 건조하다.
- 면색: 황색

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍, 소
- 설태: 백태, 니태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:30

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 53kg
- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

67세 여성 환자로, 만성 알레르기 비염을 주소로 내원. 집 대청소 후 증상 악화되었으며, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 기저질환을 가지고 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 156cm, 체중은 53kg, BMI는 21.8이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 만성 알레르기 비염을 앓고 있으며, 최근 집 대청소 후 먼지에 노출되면서 재채기, 코막힘, 코 가려움 증상이 심해졌다. 콧물은 경미하게 나타난다. 요통은 경미한 수준(1/10)이며, 소화불량 또한 복만/복통이 1/5 정도로

경미하다.

**【과거력】**

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

**【사회력】**

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중간 정도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성도 없다(0/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않고, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.5°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:38

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 59kg
- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

81세 여성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 새 카펫 설치 후 증상 악화. 이상지질혈증 및 당뇨 과거력 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 59kg, BMI는 21.4이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 코막힘이 특히 심하여 코로 숨쉬기 어려움을 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코 가려움증으로 인해 자주 코를 비빈다. 현재 증상은 호전 중이다. 발열은 없으며,



오히려 저체온 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 장시간 앉아 있는 습관이 있으며, 습한 환경과 수면 부족이 증상을 악화시킨다고 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번 정도 있으며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.3℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:45

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 93kg
- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 118/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

62세 남성 환자로, 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염 증상 (지속적인 재채기, 코 가려움, 약간의 코막힘), 요통, 소화불량, 전신 무력감을 호소하며 내원.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 93kg, BMI는 30.4이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량, 전신 무력감을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 5일간 거주 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 지속적으로 재채기를 하고, 코 가려움증을 호소하며 코를 자주 비빈다. 코막힘은 심하지 않으나 약간 불편감을 느낀다고 한다. 또한, 요통(통증 강도 3/10)과 복만/복통(3/5)을

동반한 소화불량을 호소한다. 습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 현재 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만/복통을 동반한 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 1회 소변을 보며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 36.4℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소하며 면색은 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 크다(대/태).
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다(후태).

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:53

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 76kg
- 활력징후: BP 148/97 mmHg, 맥박 74/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

51세 남성 환자로 3개월 전 황사/미세먼지 노출 후 발생한 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움) 및 변비, 수면장애, 피로감, 오한 등을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 76kg, BMI는 26.0이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 발생한 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움)과 변비, 수면장애, 피로감, 오한을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

3개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 재채기, 콧물, 코가려움 증상이 시작되어 현재까지 지속되고 있으며, 증상은

악화되는 추세이다. 특히 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 코가려움이 매우 심하여 코 주변에 염증 및 상처가 있는 상태이다. 온찜질 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받고 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이고, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만감 및 복통 (4/5)을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 땀이 많이 나는 편이며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 생각한다. 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 148/97 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 37.0℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5 수준이다. 어지럼증은 없다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 크기는 큰 편이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:00

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 137cm / 37kg
- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

10세 남환, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화로 내원. 새로 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상 발현. 재채기, 코막힘, 코 가려움 호소.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 137cm, 체중은 37kg, BMI는 19.7이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환아는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 이사 후 증상이 악화되었다. 주된 증상으로는 지속적인 재채기, 심한 코막힘, 경미한 코 가려움 등이 있다. 발열은 없으며, 오히려 저체온 경향을 보인다. 콧물은 경미하게

흐르는 정도이다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 간접흡연에 노출되는 정도이다. 운동 강도는 높다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통(2/5)을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 호소한다. 입면장애 (5/5), 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.0℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지 무력감을 호소한다. 면색은 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:08

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 151cm / 55kg
- 활력징후: BP 117/65 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

14세 남환, 3개월 전부터 알레르기비염 증상 및 소화불량, 요통 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 55kg, BMI는 24.1이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 알레르기비염 증상은 콧물, 코막힘, 코가려움이 있으며, 요통은 경미하고, 소화불량은 복만 및 복통을 동반한다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 특히 콧물, 코막힘, 코가려움이 심하다고 한다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막힌다고 한다. 재채기를 자주 하며, 코막힘으로 인해

숨쉬기 불편함을 느낀다. 또한, 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하며, 소화불량으로 인해 복만 및 복통을 호소한다. 증상은 식이조절 및 온찜질 시 완화된다고 한다. 발열은 없으나, 저체온 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/65 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며, 가려움증을 동반한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:16

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 22세 / 남
- 신장/체중: 193cm / 85kg
- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

22세 남성 환자로, 3개월 전부터 시작된 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 22세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 193cm, 체중은 85kg, BMI는 22.8이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상 (심한 콧물, 재채기, 약간의 코막힘, 코가려움), 요통 (통증 강도 4/10), 소화불량 (복만/복통 4/5)이 발현되었다고 한다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 충분한 수면 및 따뜻하게 하면 완화된다고 호소한다.

## 【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

## 【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1일 2-3회, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색으로 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁜 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 혀의 형태가 크다.
- 설태: 백태이고, 두텁다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥



- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:24

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 33세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 48kg
- 활력징후: BP 118/65 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

33세 여성, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상(심한 콧물, 코막힘, 코 가려움)과 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 33세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 48kg, BMI는 21.9이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 3일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전부터 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 알레르기비염 증상을 호소한다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 코 주변 피부가 붉고 집중이 어렵다고 한다. 재채기는 간헐적으로 발생하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편함을 느낀다. 코 가려움은 심하여 일상생활에 지장을 줄 정도이다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한

복만 및 복통은 4/5 강도이다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨 및 중풍이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 온수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 118/65 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 후태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:32

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 23세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 72kg
- 활력징후: BP 159/91 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

23세 여성 환자로, 1개월 전 반려동물 접촉 후 알레르기비염 증상(심한 콧물, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 23세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 72kg, BMI는 26.1이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상(심한 콧물, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상이 발현되었으며, 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이다. 코 주변 피부가 혈고 집중이 불가능할 정도라고 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 심하지 않으나 코 가려움이 있어 자주 비빈다고 한다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 복만감과 복통을 3/5 정도로 호소한다. 증상은

현재 호전 중이다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 매일 음주를 한다. 흡연은 0개피/일이며, 운동은 중간 강도로 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량으로 복만감과 복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통 형태이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처는 잘 하는 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 159/91 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.6°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하지 않으나 가려움증을 호소한다. 사지무력감은 없다. 면색은 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:39

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 60kg
- 활력징후: BP 117/73 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

16세 여성 환자로 만성 알레르기 비염, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 60kg, BMI는 23.4이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해지면서 알레르기 비염 증상이 발현되었다고 한다. 이후 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복하며, 최근에는 코막힘과 코 가려움이 심해져 일상생활에 불편함을 느끼고 있다. 감기 증상으로는 발열은 없으며, 오한 또한 호소하지 않는다. 콧물은 경미하게 흐르는 정도이며,



기침은 하지 않는다. 요통은 통증 강도 3/10으로 지속되고 있으며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 3/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 굳음/경변.
- 소변: 맑음, 주간 2회, 야간 0회.
- 수면: 5시간, 깊음, 기상시 무거움, 입면장애 5/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한/추위를 타며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗), 두부에 땀을 흘리며, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10).
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고, 스트레스 대처 능력이 낮다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 117/73 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:46

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 98kg
- 활력징후: BP 119/67 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

24세 여성, 알레르기비염, 6개월 전부터 발생, 봄철 악화, 비만 체형

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 98kg, BMI는 38.8이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생했으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 봄철 꽃가루에 노출 시 증상이 악화되며, 음주, 찬바람/냉기, 흡연 시에도 악화되는 경향을 보인다. 온찜질이나 따뜻하게 하면 증상이 완화된다고 한다. 요통(통증 강도 2/10)과 복만/복통(2/5)을 동반한다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

## 【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회, 불규칙하게 한다. 소화불량이 있으며, 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통의 형태이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다 (2/10).
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 기억력 저하를 호소한다. 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/67 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:55

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 83kg
- 활력징후: BP 152/91 mmHg, 맥박 106/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

30세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 알레르기 비염 증상을 주소로 내원. 고혈압 병력 및 수면 부족, 습한 환경에서 증상 악화. 코막힘, 콧물 과다, 재채기, 코 가려움 등을 호소.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 83kg, BMI는 26.5이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 2일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 코막힘, 과도한 콧물, 재채기, 코 가려움 등의 증상이 나타난다. 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 불가능하다고

한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 수면 부족 및 습한 환경에서 악화되고, 온찜질이나 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨가 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 특별한 소화 불량은 없다. 복만/복통 강도는 2/5 정도이다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 152/91 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 37.2°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 50kg
- 활력징후: BP 152/90 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

12세 여성 환자로, 1년 이상 만성 알레르기비염을 호소하며, 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 증상 시작됨. 고혈압 및 심장병 가족력, 흡연과 과로 시 증상 악화, 수면 및 식이조절 시 완화됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 50kg, BMI는 22.8이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소한다. 반려동물 접촉 후 증상이 심화되었으며, 재채기는 간헐적으로 발생하고, 코막힘이 있어 숨쉬기 약간 불편함을 느낀다. 코 가려움증이 있어 자주 비비는 모습 관찰됨. 발열은 없으며,

오히려 저체온 경향을 보인다. 오한은 호소하지 않는다. 콧물은 중등도로 계속 흐르는 양상이다.

**【과거력】**

특이 약물력은 확인되지 않았다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일이며, 규칙성은 확인되지 않았다. 생리 기간은 0일이며, 생리통은 10점 만점에 0점이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통이다.
- 소변: 맑은 색을 띠며, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 깊은 잠을 자지만 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다. 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 152/90 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:08

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 38세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 68kg
- 활력징후: BP 106/62 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

38세 여성, 1년 이상 만성 알레르기 비염, 봄철 꽃가루 노출 후 증상 악화, 고혈압 병력, 피로감, 사지무력감, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 38세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 68kg, BMI는 23.8이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 만성 알레르기 비염을 앓고 있으며, 최근 꽃가루 노출 후 재채기, 코막힘, 코 가려움 증상이 심화되었다. 감기 증상으로 콧물, 기침이 동반된다. 또한 요통과 복만, 복통을 동반한 소화불량을 호소한다. 증상은 수면 및 스트레칭

시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

고혈압으로 혈압약 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 불규칙, 복만/복통 (4/5)
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 깊은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애 (0/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 오한, 추위를 탐, 따뜻한 음료 선호
- 땀: 보통, 전신 발한, 발한 후 상쾌함
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 기억력 저하, 의욕 저하, 스트레스 대처 능력 저하

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 106/62 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 멍이 쉽게 듦, 사지무력감 호소, 피부 건조 및 가려움증 호소
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 황태, 박태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:17

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 53kg
- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

16세 남성 환자로 6개월 전 알레르기 비염 발병 후 악화되어 내원, 심한 콧물, 코막힘, 재채기, 요통, 소화불량, 전신 무력감, 어지러움, 다한 등의 증상을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 172cm, 체중은 53kg, BMI는 17.9이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 발생한 알레르기 비염으로 인한 콧물, 코막힘, 재채기, 요통, 소화불량, 전신 무력감, 어지러움, 다한 등을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

집 대청소 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 특히 콧물이 심하여 휴지로

감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 어렵다고 호소한다. 재채기를 자주 하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다. 요통은 4/10 강도로 지속되며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 평소 중등도의 운동을 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (4/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다. 어지러움 (5/5)을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 후태



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:26

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 82kg
- 활력징후: BP 110/64 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

58세 남성 환자로, 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 증상 악화. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 변비, 수족냉증, 사지무력감, 기억력 저하, 무기력감 등을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 82kg, BMI는 26.8이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 황사나 미세먼지가 심한 날 외출 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 코막힘으로 인해 호흡이 불편하고, 코 가려움증으로 자주

비비는 모습을 보인다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받아 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량으로 복만감과 복통을 3/5 정도로 느낀다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하지만 깊게 잠들지 못하고, 아침에 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 간혹 두부에 땀이 나는 경우가 있으나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/64 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.3℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 회색 설태가 두텁게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:35

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 36kg
- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

12세 여성 환자로, 1개월 전 집 대청소 후 악화된 알레르기비염을 주소로 내원하였다. 평소 찬바람과 과로에 증상이 악화되며, 스트레칭과 수면으로 완화된다. 변비와 다한, 오한을 호소하며, 수족냉증이 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 36kg, BMI는 18.9이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 집 대청소 후 알레르기비염 증상이 발현되었다. 증상은 시간이 지남에 따라 비슷하거나 오르내리는 양상을 보인다. 찬바람/냉기(冷氣)와 과로(過勞)에 의해 증상이 악화되며, 스트레칭(Stretching)과

수면(睡眠)에 의해 완화된다. 감기 증상으로 발열은 없으며, 콧물은 중등도로 지속적으로 흐른다. 기침은 없다. 비염 증상으로 재채기를 매일 하며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 편하며, 코가려움이 있어 자주 비빈다. 요통은 강도 3/10이며, 소화불량으로 복만/복통 3/5를 호소한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하다. 복만/복통 3/5를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.8℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 절로 생긴다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:43

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 57kg
- 활력징후: BP 117/63 mmHg, 맥박 85/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

14세 남성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코 가려움)과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 57kg, BMI는 22.5이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코 가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하였다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막힌다고 한다. 코막힘이 심하여 숨쉬기 불편함을 느끼며, 코 가려움 또한 심하여 일상생활에 불편감을 느낀다고 한다. 또한 요통(통증 강도 4/10)과 복만, 복통(4/5)을 동반한 소화불량을 호소하였다. 증상은



비슷하거나 오르내림이 있다고 한다. 감기 증상으로 발열은 전혀 없고, 오히려 저체온 경향을 보이며, 오한 또한 호소하지 않는다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동은 중간 강도로 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (통증강도 4/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 117/63 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 36.9℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이며, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 大/태
- 설태: 황색, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:52

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 73kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

44세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 최근 이사 후 증상 악화. 오한, 잦은 재채기, 코막힘, 흑색변, 전신 부종, 사지무력감, 난청, 어지럼증 등을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 183cm, 체중은 73kg, BMI는 21.8이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

### 【발병 에피소드】

최근 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소한다. 주요 증상으로는 잦은 재채기, 코막힘, 약간의 코 가려움이 있다. 감기 증상으로는 미열(35도 이하), 경미한 콧물이 있다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5

강도로 나타난다. 악화 요인으로는 수면 부족, 무거운 짐을 드는 행위, 흡연이 있으며, 온찜질과 따뜻하게 하는 것으로 증상이 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없으며, 과거력 또한 확인되지 않았다.

**【가족력】**

가족력으로는 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으며, 의욕이 높고, 스트레스 대처 능력도 좋은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.4℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 나타난다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 두께는 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부삭(浮數)

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:01

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 139cm / 43kg
- 활력징후: BP 147/98 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

12세 여성 환자로, 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 증상 악화됨. 콧물, 코가려움, 간헐적 기침, 요통, 소화불량 등을 주소로 내원.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 139cm, 체중은 43kg, BMI는 22.3이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 콧물, 코가려움, 간헐적 기침, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 불가능하다고

한다. 간헐적인 기침과 함께 심한 코가려움으로 일상 생활에 불편함을 느끼고 있다. 요통(통증 강도 4/10)과 복만/복통(4/5)을 동반한 소화불량 증상 또한 호소한다. 습한 환경과 스트레스가 증상 악화 요인으로 작용한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 학생으로, 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일이며, 불규칙하고 생리 기간은 0일이다. 생리통은 없다 (0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통(4/5)이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다. 땀은 나지 않으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 147/98 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지 무력감을 호소하며 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5이며 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 작다.
- 설태: 회색, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:10

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 68kg
- 활력징후: BP 132/83 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

26세 남성 환자로 1개월 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화와 요통, 소화불량을 호소하며 내원.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 68kg, BMI는 20.8이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 1개월 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 알레르기 비염 증상으로 재채기 발작, 경미한 코막힘, 약간의 코 가려움을 호소한다. 요통은 4/10 강도로 나타나며, 소화불량 증상으로는 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 감기 증상은 발열은 없으며, 오한 증상 또한 나타나지 않는다.

## 【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 수면, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/83 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 절로 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 없다.
- 면색: 정상.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태, 니태.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:18

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 80kg
- 활력징후: BP 112/72 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

42세 남성, 1개월 전 반려동물 접촉 후 알레르기 비염 증상 악화, 흑색변, 혈뇨, 다한, 오한, 사지무력감 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 80kg, BMI는 30.9이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 흑색변, 혈뇨, 다한, 오한, 사지무력감을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 이후 증상이 점차 악화되어 현재는 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 매우 힘든 상태이다. 또한, 흑색변과 혈뇨가 나타나고 있으며, 전신에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다. 오한을 느끼며 추위를 타고, 사지무력감을

호소한다. 안정 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일, 불규칙하며, 소화불량으로 복만 및 복통(2/5)을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 7시간, 깊은 수면을 취하나 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗), 전신에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 112/72 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 홍조

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설
- 설태: 황태, 박태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:25

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 77kg
- 활력징후: BP 134/83 mmHg, 맥박 86/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

59세 여성, 1주 전 새 카펫 설치 후 발생한 알레르기 비염 증상 악화로 내원. 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움 호소. 평소 변비, 냉수 선호, 수족냉증, 사지무력감, 얇은 수면, 기억력 저하 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 77kg, BMI는 27.6이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화를 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 3일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되어 내원하였다. 주요 증상으로는 코막힘, 콧물, 재채기, 코 가려움 등이 있으며, 특히 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 호소한다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 저체온 경향을 보이며,

오한은 느끼지 않는다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상이며, 기침은 빈번하게 발생한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코 가려움으로 인해 자주 코를 비비는 것을 신경 쓰여 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화 상태는 보통이다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 굳기이다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 얕은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느끼지 못한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력이 나쁘고 무기력함을 느낀다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 134/83 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 36.8℃, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 피로감을 느끼며, 부종은 없고 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 황색의 니태이다.

**【맥진 소견】**



- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:33

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 147cm / 48kg
- 활력징후: BP 127/67 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

15세 여성 환자로, 1주 전 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 147cm, 체중은 48kg, BMI는 22.2이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 집 대청소 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되어 재채기를 자주 하고, 양쪽 코막힘이 심하며, 코 가려움을 호소한다. 동반하여 3/10 강도의 요통과 복만, 복통을 호소한다. 현재 증상은 호전 중이다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다(0/10).

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 1회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통은 3/5 정도이다.
- 대변: 하루 1회, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에 1회 황색 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 전신에 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 127/67 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신에 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 느끼지 않는다(0/5).
- 면색: 황색을 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다(小).
- 설태: 황색의 후태(厚苔)가 낀다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)

- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 완맥(緩脈)

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:42

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 79kg
- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

49세 남성 환자로 2-3주 전부터 시작된 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)과 잦은 기침, 요통, 소화불량, 피로감, 오한, 땀, 수면장애 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 79kg, BMI는 23.6이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 시작된 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)과 잦은 기침, 요통, 소화불량, 피로감을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전 친구 집 방문 후 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 비염 증상이 시작되었으며, 증상은 점차 악화되는

추세이다. 기침은 빈번하게 발생한다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인해 복만 및 복통 (4/5)을 호소한다. 안정 및 식이조절 시 증상이 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 깊은 잠을 자지만, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (0/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.9℃, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 느낀다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:51

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 50kg
- 활력징후: BP 108/68 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

59세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원. 환절기 기온 변화로 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기저질환을 가지고 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 50kg, BMI는 18.6이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

환자는 알레르기 비염 증상으로 재채기를 자주 하고, 코막힘이 심하여 숨쉬기 불편하며, 코 가려움을 호소한다. 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 증상이 완화된다고 한다. 발열은 없으나 오한을 느끼며, 콧물은 계속 흘러나온다.



요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 복만/복통을 3/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다. 수술력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나, 현재는 폐경 상태이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 땀을 흘리는 도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 108/68 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.4℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:59

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 53kg
- 활력징후: BP 157/97 mmHg, 맥박 107/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

13세 남학생, 1개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움) 및 요통, 소화불량, 피로감을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 53kg, BMI는 20.7이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량, 피로감을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 재채기, 콧물이 시작되었으며, 이후 코막힘, 코가려움이 발생했다. 콧물은 계속 흐르는 양상을 보이며, 코막힘은 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기 힘든 정도이다. 재채기는 간헐적으로

발생하며, 코가려움은 자주 비비는 정도로 신경 쓰인다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 3/5 정도이다. 무거운 짐을 들거나 수면 부족, 장시간 앉아 있을 때 증상이 악화되며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 피로감을 호소하며, 사지무력감을 동반한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간 1회이다.
- 수면: 7시간, 얕은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한을 보이며, 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다. 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 157/97 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 37.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 호소하지 않는다.
- 면색: 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:07

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 27세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 85kg
- 활력징후: BP 114/65 mmHg, 맥박 117/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

27세 여성 환자로, 만성 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 27세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 85kg, BMI는 35.4이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 알레르기 비염 증상으로 재채기를 매일 하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편함을 호소한다. 코가려움은 경미하다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량 증상으로 복만/복통을 3/5 정도로 호소한다.

## 【과거력】

당뇨, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

## 【가족력】

가족력으로 당뇨, 심장병이 있다.

## 【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다. 복만/복통 3/5
- 대변: 1회/일, 황갈색, 보통
- 소변: 맑음, 주간 9회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얕은 수면, 기상 시 피곤함, 입면장애 1/5, 중도각성 5회
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리고, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 다한(多汗), 전신
- 통증: 요통 3/10
- 정신/정서: 스트레스 대처력이 나쁘고, 기억력은 좋으며, 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/65 mmHg, 맥박 117회/분, 체온 36.4°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 보인다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍, 대설
- 설태: 백태, 박태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 매력: 유력

- 맥상: 완맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:16

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 59kg
- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

14세 여성 환자로, 6개월 전 황사/미세먼지 노출 후 발생한 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소한다. 과거력 상 당뇨, 심장병 가족력이 있으며, 수면 부족, 스트레스, 기름진 음식 섭취 시 증상 악화된다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 153cm, 체중은 59kg, BMI는 25.2이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발현되었다.

콧물은 지속적으로 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코막힘으로 인해 호흡이 다소 불편하다고 한다. 또한, 요통(통증 강도 2/10)과 복만/복통(2/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 수면 부족, 스트레스, 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력 상 당뇨, 심장병이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 녹색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 146/99 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.3℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 후태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:23

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 70kg
- 활력징후: BP 122/83 mmHg, 맥박 83/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

59세 여성 환자로 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염과 관련된 증상 (콧물, 코막힘, 재채기), 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 70kg, BMI는 29.9이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 콧물, 코막힘, 재채기 등의 알레르기 비염 증상을 호소한다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이 있다. 재채기는 간헐적으로 나타난다. 또한, 요통 (통증 강도 2/10)과

복만, 복통 (2/5)을 동반한 소화불량 증상을 호소한다. 악화 요인으로는 수면 부족과 기름진 음식 섭취가 있으며, 스트레칭 시 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색 변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 (5/5)가 있으며, 중도각성은 없다 (0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리며, 특히 두부에 다한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 두부에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다 (2/10).
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/83 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 37.1℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움 (5/5)을 호소한다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 백태, 후태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:30

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 83kg
- 활력징후: BP 117/60 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

51세 여성 환자로 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 83kg, BMI는 28.7이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 (콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기)과 요통, 소화불량(복만, 복통)을 주소로 내원하였다. 현재 증상은 호전 중이다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 콧물, 코막힘, 코가려움, 재채기 증상이 나타난다. 특히 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막히는 증상을 겪고 있다. 요통은 통증 강도

3/10으로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 3/5 정도로 불편함을 느끼고 있다. 증상은 무거운 짐을 들거나 수면 부족, 과로 시 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도 흘리며, 주로 두부에서 땀이 난다.
- 통증: 요통을 호소하며 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/60 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.1℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:39

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 23세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 54kg
- 활력징후: BP 154/91 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

23세 여성 환자로, 1개월 전부터 알레르기비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)과 요통, 소화불량 등을 호소한다. 당뇨 병력과 가족력이 있으며, 스트레스와 수면 부족이 악화 요인으로 작용한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 23세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 54kg, BMI는 21.6이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움), 요통 및 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 알레르기비염 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상이 발현되어 지속적으로 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등을 호소하고 있다. 감기 증상으로 발열은 없으나 저체온 경향을 보이며, 오한은 호소하지 않는다. 요통은 통증 강도

4/10이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 4/5 정도로 호소한다. 증상은 호전 중이다.

## 【과거력】

당뇨 병력이 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 당뇨 및 심장병이 있다.

## 【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 0/10이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 얇은 잠을 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 전신에서 땀이 나지 않는다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처력은 좋으나, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/91 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.6°C, 호흡 22회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 띤다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부건실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:46

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 37세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 50kg
- 활력징후: BP 122/82 mmHg, 맥박 98/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

37세 여성 환자로, 1주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상(잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움)을 주소로 내원하였다. 평소 잦은 음주와 수면 부족, 스트레스가 있으며, 소화불량과 요통을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 37세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 154cm, 체중은 50kg, BMI는 21.1이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상(잦은 재채기, 코막힘, 심한 코 가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 새로 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 잦은 재채기, 코막힘, 심한 코 가려움을 호소한다. 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느끼며, 코 가려움으로 일상 생활에 지장을 받고 있다. 요통(3/10)과 소화불량(복만/복통 3/5)을 동반한다. 환자는 현재 증상이 호전

중이라고 진술하였다. 감기 증상(발열, 오한)은 없다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력 상 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 잦은 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/82 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 37.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부는 각질이 있다. 사지무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황색, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 삭맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:10:54

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 53kg
- 활력징후: BP 103/71 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

14세 여성 환자로 1년 이상 만성 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 최근 이사한 집에서 증상이 시작됨. 오한, 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움, 흑색변, 혈뇨, 수면장애, 전신 부종, 사지무력감, 피부 가려움, 이명, 난청 등의 증상을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 155cm, 체중은 53kg, BMI는 22.1이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 최근 이사 후 증상이 심화되었다고 한다. 감기 증상으로 발열은



없으나 오한을 느끼며, 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하고, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상을 보인다. 기침은 지속적으로 나타난다. 비염 증상으로는 재채기가 발작 수준으로 나타나며, 코막힘으로 인해 숨쉬기가 약간 불편하고, 코가려움으로 인해 자주 비비는 습관이 있다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다. 장시간 앉거나 과로하면 증상이 악화되고, 휴식을 취하면 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다. 여성력으로는 생리주기 28일로 규칙적이나, 생리 기간은 0일이며, 생리통은 없는 것으로 확인되었다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 흑색변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5점 만점 중 1점, 중도각성은 5회 정도 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮다. 의욕은 높은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 103/71 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.3°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 느끼지 않는다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대/태하다.
- 설태: 백태이며, 니태를 띤다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 134cm / 35kg
- 활력징후: BP 111/61 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

11세 남환, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움) 및 소변 이상, 다한, 피로감, 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 134cm, 체중은 35kg, BMI는 19.5이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움), 소변 이상, 다한, 피로감, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 재채기를 지속적으로 하고, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느끼며, 코가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받고 있다. 온찜질 및 식이조절 시

증상이 다소 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 111/61 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신에 멍이 절로 생기며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고, 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 회색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:11

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 55kg
- 활력징후: BP 109/72 mmHg, 맥박 81/분, 체온 35.5°C

## ■ 요약

16세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)과 함께 요통, 소화불량, 전신 부종, 사지무력감, 잦은 흑색변, 오한, 야간 도한을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 55kg, BMI는 21.5이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전 새로운 집으로 이사 후 알레르기비염 증상(재채기 발작, 코막힘, 코가려움)이 발생하였다. 동반되는 증상으로 요통(통증 강도 4/10), 복만/복통(4/5), 전신 부종, 사지무력감이 있다. 악화 요인으로 장시간 앉아있는 자세가

있으며, 스트레칭 및 안정을 취하면 증상이 완화된다. 감기 증상으로 발열은 없으며(35도 이하의 저체온), 오한 증상은 나타나지 않고, 콧물은 지속적으로 흐르는 양상이다. 기침은 하지 않는다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨, 심장병이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 섭취하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 9회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀이 잘 나지 않으나(無汗), 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통(4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 109/72 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 35.5℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 이명(3/5), 난청(3/5), 어지러움(4/5)이 있다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 혀가 얇다(小).
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:19

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 142cm / 48kg
- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

12세 여성 환자로, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 직장 내 사무실 이전 후 증상 시작. 스트레스, 찬바람, 무거운 짐에 의해 악화되며, 온찜질과 식이조절로 완화됨. 녹색변, 혈뇨, 다한, 수족냉증, 사지무력감, 피부 가려움, 어지럼증 등을 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 142cm, 체중은 48kg, BMI는 23.8이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 직장 내 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 재채기는 간헐적으로 나타나고,

코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기 편하다고 호소한다. 코 가려움은 심하여 일상생활에 방해를 받는다고 한다. 요통은 강도 2/10으로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 2/5 정도이다. 스트레스, 찬바람/냉기, 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 온찜질과 식이조절 시 증상이 완화된다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 특이 소화 불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 붉은색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 건망이 있으며 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 145/97 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.8℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:26

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 25세 / 남
- 신장/체중: 177cm / 91kg
- 활력징후: BP 160/109 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

25세 남성, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염과 고혈압을 주소로 내원. 환절기 기온 변화로 증상 악화. 변비, 수면 부족, 잦은 음주 및 흡연, 무한, 전신 부종, 사지 무력감, 기억력 저하 등을 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 25세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 177cm, 체중은 91kg, BMI는 29.0이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 7일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

6개월 전 고혈압 진단 후 혈압약 복용 중이다. 알레르기 비염으로 재채기, 코막힘, 코 가려움 증상을 호소하며, 특히 코 가려움이 심하여 일상생활에 불편함을 느낀다. 감기 증상은 미열(35도 이하)이 있으며 오한은 없다.

## 【과거력】

고혈압으로 혈압약 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력 상 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

## 【사회력】

사무직에 종사하며, 음주를 자주 하고 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통은 2/5 정도이다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황갈색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며, 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 160/109 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 1/5 정도이며, 어지러움은 1/5, 난청은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 황태와 니태가 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:34

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 28세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 64kg
- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

28세 남성 환자로, 1년 이상 만성 알레르기비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 3일 전 새 사무실 이동 후 증상 악화됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 28세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 64kg, BMI는 25.0이다.

### 【주소증】

만성 1년 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움), 요통 (4/10), 소화불량(복만/복통 4/5)을 호소한다. 스트레칭 시 요통이 완화되는 경향이 있다. 최근 새 사무실로 이동 후 증상이 심해졌다고 한다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

고혈압, 당뇨, 중풍 가족력이 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소함.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변을 본다고 한다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/80 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.0°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 절로 멍이 드는 경향이 있다. 사지 무력감을 느낀다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 두터운 설태가 덮여 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥



- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:42

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 40세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 75kg
- 활력징후: BP 100/70 mmHg, 맥박 91/분, 체온 37.4°C

## ■ 요약

40세 남성 환자로, 1개월 전 이사 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 이상지질혈증 및 당뇨 병력, 흡연, 불규칙한 식사, 수면 장애, 땀은 변, 무한, 오한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명, 어지러움, 흉조 등을 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 40세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 75kg, BMI는 25.6이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 4일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상(지속적인 재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었으며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 요통은 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통(3/5)을 호소한다. 기름진 음식을

섭취하거나 장시간 앉아 있을 경우 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상은 없으며, 발열은 나타나지 않고, 오히려 저체온을 보인다. 오한은 없으며, 콧물은 경미하고, 기침은 하지 않는다.

**【과거력】**

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 정도이며, 중도각성이 5회 정도 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 100/70 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 37.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(소).
- 설태: 백색 설태가 두껍게 덮여 있다(후태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:52

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 24세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 48kg
- 활력징후: BP 101/73 mmHg, 맥박 56/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

24세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기비염, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 묽은 번, 다한, 하지 부종, 사지 무력감 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 24세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 48kg, BMI는 15.5이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염으로 인한 잦은 재채기, 심한 코막힘, 코 가려움, 묽은 번, 다한, 하지 부종, 사지 무력감을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기비염 증상이 발현되어 현재까지 지속 중이며, 호전과 악화를 반복하고 있다. 특히

수면 부족 및 장시간 앉아 있는 자세가 증상을 악화시키며, 온찜질 시 일시적인 완화를 보인다. 감기 증상은 발열은 없으나 콧물이 심하게 흐르며, 재채기를 자주 하고, 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기 어렵다고 호소한다. 코 가려움 또한 매우 심하여 코 주변 피부가 헐고 염증이 발생한 상태이다. 또한, 요통(통증 강도 4/10)과 복만/복통(4/5)을 동반하며 소화불량을 호소한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 하지 않고 흡연은 0.0개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만, 복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변의 양상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나 중도각성이 잦다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗) 증상을 보이며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 기억력은 양호하며 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 101/73 mmHg, 맥박 56회/분, 체온 36.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 경미(1/5)하다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.

- 설태: 회태, 박태가 관찰된다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부근실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:00

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 50세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 45kg
- 활력징후: BP 157/95 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

50세 여성, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 50세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 45kg, BMI는 19.0이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 악화되었으며, 특히 새 카펫 설치 후 증상이 심해졌다고 한다. 감기 증상은 발열이 전혀 없고, 콧물이 심하게 흐른다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 3/5 정도로 호소한다. 악화 요인으로서는 스트레스, 습한 환경, 수면 부족을 꼽았으며, 식이 조절과 충분한



수면 시 증상이 완화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로는 고혈압과 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙적이다. 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 스스로 평가한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 157/95 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:09

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 48kg
- 활력징후: BP 147/98 mmHg, 맥박 99/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

61세 여성 환자로, 1개월 전 새 사무실 이전 후 발생한 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 157cm, 체중은 48kg, BMI는 19.5이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 (재채기, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 직장 내 사무실 이전 후 7일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 새 사무실로 이전한 후 알레르기 비염 증상이 발생했으며, 재채기를 자주 하고, 코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하며, 코가려움이 매우 심하다고 호소한다. 요통은 강도 2/10 정도이며, 소화불량으로 복만 및

복통이 2/5 정도 발생한다. 스트레스가 악화 요인으로 작용한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 음주를 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 3회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애는 5/5, 중도 각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 무기력함을 느낀다. 기억력은 좋은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 147/98 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없다. 멍은 정상이다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:17

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 51kg
- 활력징후: BP 100/84 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

53세 남성, 1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통 및 소화불량 동반

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 51kg, BMI는 17.0이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 4일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 최근 4일 동안 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는 지속적인 재채기, 코막힘, 심한 코 가려움이 있다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량은 복만 및 복통을 동반하며 강도는 3/5이다. 습한 환경과 장시간 앉아 있는 자세는 증상을 악화시키며, 스트레칭과 온찜질은 증상을 완화시킨다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

## 【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일이다. 운동은 중등도로 한다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색 변을 보고, 변이 굳다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수(熱水)를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/84 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.7°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 황색이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 후태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부(浮)맥

- 맥폭(대세): 세(細)맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완(緩)맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:26

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 60kg
- 활력징후: BP 131/85 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

48세 여성 환자로, 1주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 재채기, 콧물 등의 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 60kg, BMI는 23.4이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

1주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 재채기와 콧물이 시작되었으며, 증상이 점차 악화되어 코막힘과 코가려움이 동반되었다. 요통은 4/10 강도로 지속되며, 소화불량으로 인한 복만감과 복통이 4/5 정도로 느껴진다. 감기 증상은

없고, 발열은 없으나 오한을 호소한다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 이상지질혈증 약을 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하고, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다. 생리주기는 28일이며 불규칙하고, 생리통은 거의 없다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 복만감과 복통을 호소한다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/85 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.7°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다.
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:33

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 39세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 73kg
- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

39세 여성 환자로, 1주 전 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상과 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 39세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 73kg, BMI는 28.5이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염 증상, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전 친구 집을 방문한 이후 재채기 발작, 코막힘, 약간의 코 가려움 증상을 호소한다. 콧물은 계속 흐르는 양상이며, 기침을 자주 한다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다.

증상은 따뜻하게 하거나 스트레칭을 하면 완화되지만, 무거운 짐을 들거나 습한 환경, 흡연 시 악화된다고 한다.

**【과거력】**

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 하고 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 3/5
- 대변: 하루 1회, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 낮에 6회, 밤에는 보지 않으며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 7시간 정도 자지만 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 3/10
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 118/74 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.1°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 황색, 厚苔

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:41

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 71kg
- 활력징후: BP 153/94 mmHg, 맥박 73/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

62세 남성 환자로, 3개월 전 직장 내 사무실 이동 후 발생한 알레르기 비염, 코막힘, 재채기, 요통 및 소화불량 증상을 호소한다. 과거력으로 이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 다한, 오한, 수족냉증을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 71kg, BMI는 22.9이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 코막힘, 재채기, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기 비염 증상이 발현되어 재채기, 코막힘, 코가려움 증상이 지속적으로 나타나고 있다. 특히 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 호소하며, 재채기는 매일 지속적으로 나타난다.

온찜질 및 따뜻하게 하면 증상이 완화된다. 요통은 강도 2/10으로 경미하게 나타난다. 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 2/5 정도로 불편감을 느낀다.

**【과거력】**

이상지질혈증 및 당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망 증상이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 153/94 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 36.8℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피로감을 호소한다. 피부는 각질이 있고 건조한 상태이다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색이며, 혀가 크고 붓는 느낌(대/태)이 있다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

**【맥진 소견】**



- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:50

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 52kg
- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 100/분, 체온 35.1°C

## ■ 요약

16세 여성 환자로, 2-3주 전 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 알레르기비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 52kg, BMI는 20.3이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었다고 한다. 코막힘은 양측이 심하며, 코가려움 또한 매우 심하여 상처 및 염증이 동반된 상태이다. 요통은 통증 강도 4/10으로 지속되며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 당뇨와 심장병이 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮다. 여성력으로 생리주기는 22일로 불규칙하며, 기간은 3일, 생리통은 4/10 정도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 없으며 (無汗), 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (상세 내용은 현병력 참조)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 보통 수준이다. 스트레스 대처 능력은 낮은 편이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/70 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 35.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감은 없으나, 땀을 흘리지 않아 땀을 흘린 후 피곤하고 냉한 느낌이 든다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:12:57

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 67세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 58kg
- 활력징후: BP 109/62 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

67세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움), 지속적인 기침, 그리고 동반되는 요통, 소화불량을 호소하며 내원하였다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 67세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 58kg, BMI는 18.7이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염, 지속적인 기침, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었으며, 기침은 하루 종일 지속되는 양상이다. 요통은 강도 2/10이며, 소화불량은 복만/복통 2/5로 나타난다. 찬바람/냉기에 증상이 악화되고,

스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 주간에 음주를 한다. 흡연은 하지 않으며, 중간 강도의 운동을 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 5회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(0/5).
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 109/62 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.3°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가렵다.
- 면색: 홍조

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 후태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:04

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 139cm / 36kg
- 활력징후: BP 163/109 mmHg, 맥박 55/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

10세 여성 환자로 2-3주 전부터 알레르기 비염, 변비, 요통, 소화불량 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 139cm, 체중은 36kg, BMI는 18.6이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 변비, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 새로 이사한 집으로 이사한 후 알레르기 비염 증상이 발현하였다. 환자는 재채기를 빈번하게 하고 코막힘이 있으며 코 가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받는다고 호소한다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 콧물이 계속 흐르는 증상이 있다. 또한, 변비 증상과 함께 녹색변을 보며, 요통 강도는 3/10 정도이다. 소화불량



증상으로 복만 및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 환자는 스트레스에 의해 증상이 악화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며 생리통은 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며 소화는 보통이다. 오심 및 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 스트레스 대처 능력이 낮다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 163/109 mmHg, 맥박 55회/분, 체온 37.3°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 피부는 건조하다. 사지무력감은 없다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:13

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 79kg
- 활력징후: BP 111/74 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

22세 여성, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 및 요통, 소화불량 호소. 고혈압 병력, 가족력 상 고혈압 및 심장병 존재.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 156cm, 체중은 79kg, BMI는 32.5이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 4일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)이 발현되었다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 감기 증상(발열, 오한, 기침)은 동반되지 않았다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로 복만/복통 4/5를 호소한다. 무거운 짐을 들거나 흡연 시 증상이 악화되는

경향을 보인다.

**【과거력】**

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력 상 고혈압 및 심장병이 있다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 두부에 땀을 흘리고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (4/10)
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 111/74 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 황태, 니태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:22

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 59kg
- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

17세 남성 환자로, 1주 전 새 카펫 설치 후 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원함. 평소 과로하며 흡연력이 있고, 가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있음. 오한, 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 비염 증상과 함께 요통, 소화불량을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 59kg, BMI는 23.3이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 5일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 보인다. 주 증상으로는 콧물,

재채기, 코막힘, 코가려움 등이 있으며, 요통과 소화불량 증상도 동반한다. 과로 시 증상이 악화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 학생이며, 비음주자이다. 흡연은 하루 2.9460327898905136개피 정도 한다. 운동 강도는 높다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통은 2/5 정도이다.
- 대변: 하루 1회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 보통으로, 전신에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘다고 느끼며, 의욕은 높다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 130/80 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5 정도이며, 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:31

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 55kg
- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

14세 여성 환자로, 6개월 전 황사/미세먼지 노출 후 발생한 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 호소한다. 평소 오한을 느끼며, 수족냉증과 야간 도한 증상이 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 153cm, 체중은 55kg, BMI는 23.5이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기 비염 증상이 발현되었다. 콧물은 지속적으로 흐르며 휴지를 자주 사용하게 된다고 한다. 코막힘이 있고 숨쉬기 약간 불편하며 코 가려움이 심하여 염증이 생긴 상태이다. 증상은

현재 호전 중이다. 찬바람/냉기 (冷氣)에 노출 시 증상이 악화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 특이 소화불량 증상은 없으나 복만감과 복통이 간헐적으로 나타난다 (2/5).
- 대변: 하루 1회, 황색 변을 보며, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 간헐적으로 발생하며 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 127/80 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 느끼며, 절로 머리가 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 소

- 설태: 백태, 후태

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:39

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 58kg
- 활력징후: BP 111/64 mmHg, 맥박 65/분, 체온 36.1°C

## ■ 요약

28세 여성 환자로 6개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 봄철 꽃가루 노출 후 증상 악화되어 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 163cm, 체중은 58kg, BMI는 21.8이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 특히 봄철 꽃가루 노출 시 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 증상이 심해지는 양상을 보인다. 증상은 휴식 시 다소 완화되나, 흡연 및 장시간 앉아있는 자세에서 악화된다고 한다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

## 【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 1회로 불규칙하다. 복만 및 복통이 있으며 (4/5), 소화불량 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 2회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (0/5), 중도각성 (0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며 (無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 낮다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/64 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 36.1°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태를 보인다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:46

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 58kg
- 활력징후: BP 168/109 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

41세 남성 환자로 1년 이상 지속된 알레르기비염 증상과 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 동반하고 있으며, 최근 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 증상 악화를 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 58kg, BMI는 17.5이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염, 코막힘, 코가려움, 콧물 과다를 주소로 내원하였다. 요통 및 소화불량 증상도 동반한다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 알레르기비염 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소한다. 반려동물이 있는 환경에 노출 시 재채기, 코막힘, 코가려움, 콧물 증상이 심해지는 양상을 보인다. 최근 친구 집 방문 후 증상이 악화되었다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며,

소화불량으로 복만 및 복통이 있다. 음주, 기름진 음식 섭취, 찬바람/냉기에 노출 시 증상이 악화된다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 가족력이 있다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 비음주자이다. 흡연은 0.0개피/일, 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 12시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한/추위를 타며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 발한 정도는 보통이나 야간/도한이 있으며, 땀 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 3/10.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 168/109 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.1℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 회태, 니태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥



- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:13:56

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 85세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 47kg
- 활력징후: BP 123/65 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

85세 남성 환자로, 6개월 전 직장 내 사무실 이동 후 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 흡연력이 존재함. 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움, 혈뇨, 수면의 질 저하, 오한, 무한 등의 증상을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 85세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 47kg, BMI는 14.7이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 6개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 이후 증상이 악화되는 경과를 보이고

있다. 주요 증상으로는 지속적인 재채기, 경미한 코막힘, 잦은 코가려움 등이 있다. 발열은 없으나 오한을 느끼며, 땀은 거의 나지 않고 야간에 도한이 발생한 후 열감을 느낀다고 한다. 또한 혈뇨 증상이 있으며, 요통 및 경미한 복만/복통을 호소한다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하고 있다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량 증상이 경미하게 나타난다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 얕으며 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 발생하고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 미미하다. 복만/복통은 1/5로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 양호하고 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 123/65 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.2℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지럼증은 없다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 소
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:04

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 76kg
- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

19세 남성 환자로, 2-3주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 76kg, BMI는 24.8이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 요통과 소화불량도 동반한다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되었으며, 현재 호전 중이다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 콧물이 지속적으로 흐르고, 하루 종일 기침을 한다. 비염 증상으로는 재채기를 자주 하고, 코막힘이

분명하게 느껴지며 숨쉬기 불편하고, 코가려움으로 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 2/10이며, 소화불량으로 복만/복통이 2/5 정도이다. 과로와 찬바람/냉기에 노출 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

당뇨를 앓고 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 두부에 땀을 많이 흘리고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/62 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.3°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다. 멍이 잘 든다. 이명 강도는 5/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:11

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 81kg
- 활력징후: BP 111/60 mmHg, 맥박 65/분, 체온 38.4°C

## ■ 요약

18세 여성 환자로 3개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 167cm, 체중은 81kg, BMI는 29.0이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 재채기, 콧물 증상이 발현되었으며, 이후 증상 악화와 호전을 반복하고 있다. 특히 습한 환경, 스트레스, 수면 부족 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 안정 및 휴식 시 증상이



완화된다. 현재는 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘이 심하여 코로 숨쉬기 어려움을 호소한다. 코 가려움 또한 심하여 일상생활에 불편을 느끼고 있다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만, 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 황색뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 좋으나, 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 111/60 mmHg, 맥박 65회/분, 체온 38.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명은 1/5 강도로 들리고 난청은 없다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 설체가 크다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:20

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 144cm / 39kg
- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

10세 남자 환자로, 1개월 전 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상 및 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 10세 남 환자로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 39kg, BMI는 18.8이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 1개월 전 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 콧물, 코막힘, 코 가려움, 재채기 등의 비염 증상이 발생하였다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 숨쉬기 약간 불편한 정도이다. 코 가려움은 자주 비비게 되어 신경 쓰인다고 한다. 또한, 복만/복통이 4/5

정도로 발생하고, 요통은 통증 강도 4/10 정도로 나타난다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 기름진 음식 섭취 시 악화되고, 수면 및 휴식 시 완화된다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 전신에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 118/69 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.0°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 사지 무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띈다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥, 부긴실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:27

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 74세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 64kg
- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

74세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (콧물, 재채기, 코가려움) 및 요통, 소화불량을 호소한다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압이 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 74세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 64kg, BMI는 19.3이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 콧물, 재채기, 코가려움이 지속적으로 나타난다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상을 보인다. 요통은 통증

강도 2/10으로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 2/5 정도의 강도로 나타난다. 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다. 수술력은 확인되지 않았다.

**【가족력】**

특이 가족력은 확인되지 않았다.

**【사회력】**

가끔 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식욕은 보통이며, 소화불량으로 복만/복통이 있다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다. 횡수는 불규칙하다.
- 소변: 적색/혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도로 땀이 나며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움이 있다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:36

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 87kg
- 활력징후: BP 114/68 mmHg, 맥박 86/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

58세 여성 환자로, 1개월 전 황사/미세먼지 노출 후 발생한 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 수면 부족과 스트레스가 증상 악화 요인으로 작용한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 152cm, 체중은 87kg, BMI는 37.7이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기 비염 증상이 발생하여 지속적으로 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움을 호소한다. 특히 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막히는 증상을

보인다. 수면 부족과 스트레스 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 스트레칭 및 안정을 취할 경우 증상이 다소 완화된다고 한다.

**【과거력】**

고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압, 심장병의 가족력이 있다.

**【사회력】**

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만감 및 복통(2/5)을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 114/68 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 36.9℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 사지무력감을 느끼며, 피부가 건조하다. 이명(5/5), 경미한 난청(1/5)을 호소하며, 어지러움(4/5)을 느낀다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황색의 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:46

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 21세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 84kg
- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.7°C

## ■ 요약

21세 여성 환자로, 3개월 전 집 대청소 후 발생한 알레르기 비염 증상 (콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소하며 내원함. 평소 이상지질혈증을 앓고 있으며, 피로감, 수면 문제, 오한, 수족냉증을 동반한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 21세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 84kg, BMI는 34.1이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상 (콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 알레르기 비염 증상은 집 대청소 후 먼지에 노출되어 악화되었다.

### 【발병 에피소드】

환자는 3개월 전 집 대청소를 하던 중 먼지에 심하게 노출된 이후 알레르기 비염 증상이 시작되었다고 한다. 이후 증상이 점차 악화되어 일상생활에 불편함을 느끼고 내원하였다.

### 【현병력】

환자는 3개월 전부터 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상을 호소한다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하게 되며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이 있다고 한다. 코막힘은 양쪽 코 모두 심하며 코로 숨쉬기가 힘들다고 한다. 재채기는 매일 지속적으로 하며, 코가려움 또한 자주 느껴 신경 쓰인다고 한다. 또한 요통과 함께 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 4/5 정도로 나타난다.

**【과거력】**

환자는 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 심장병이 있다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 주간에 한다. 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동은 중간 강도로 하고 있다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.7°C, 호흡 28회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 하지 부종이 있고 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 느끼며, 피부는 건조하고 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 정상이다.

- 설태: 황태, 후태이다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:14:54

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 65kg
- 활력징후: BP 150/99 mmHg, 맥박 84/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

48세 남성, 1주 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 65kg, BMI는 21.2이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 호소하며, 요통 및 소화불량 증상도 함께 나타났다. 알레르기 비염 증상은 꽃가루가 날리는 시기에 악화되는 경향을 보이며, 요통은 통증 강도 2/10으로 지속적으로 나타난다. 소화불량 증상은 복만감 및 복통(2/5)을 동반한다. 흡연, 음주, 무거운 짐을 드는 행위 등이 증상을

악화시키며, 스트레칭은 증상 완화에 도움을 준다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량과 복만감을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 150/99 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 37.1°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느낀다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 백태, 후태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥



- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:03

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 37세 / 남
- 신장/체중: 179cm / 74kg
- 활력징후: BP 155/99 mmHg, 맥박 94/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

37세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하며, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증을 기저질환으로 가지고 있다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 37세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 179cm, 체중은 74kg, BMI는 23.1이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 콧물이 심하게 쏟아지는 양상을 보인다. 코 주변 피부가 빨갛으며 집중이 불가능하다고 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 경미하고 코 가려움이

심하여 일상생활에 불편을 겪고 있다. 요통은 통증 강도 4/10으로 보고되었으나, 구체적인 통증 양상은 확인되지 않았다. 소화불량 증상으로는 복만 및 복통이 4/5 강도로 나타나며, 구체적인 증상은 확인되지 않았다. 증상은 악화되는 경향을 보이며, 기름진 음식 섭취, 흡연, 찬바람/냉기에 노출 시 악화된다고 한다. 특별한 완화 요인은 없다.

**【과거력】**

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받아 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 굳기는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에만 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋고, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 155/99 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 36.4℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 멍이 절로 생기는 증상이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있으나, 가려움증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:11

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 141cm / 44kg
- 활력징후: BP 165/108 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

12세 여성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코가려움)을 호소하며, 요통 및 소화불량 증상 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 141cm, 체중은 44kg, BMI는 22.1이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 2일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전 새 카펫 설치 후 비염 증상 발현되었으며, 코막힘이 주 증상으로 양측 비강 폐색이 심하여 코로 숨쉬기 힘들어한다. 콧물은 지속적으로 흐르며 휴지를 자주 사용하고, 코 가려움 또한 심하여 자주 비비는 모습 관찰됨. 요통은 강도 4/10으로, 소화불량 증상(복만, 복통) 또한 4/5 강도로 호소한다. 습한 환경과 스트레스에 의해 증상

악화된다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량(복만, 복통) 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 주간 4회, 야간 1회, 황색 뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5) 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 발한 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 4/10
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 165/108 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 다한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움 호소, 절로 멍이 든다.
- 면색: 정상

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 크다.
- 설태: 황색, 후태

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:20

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 41세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 56kg
- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 89/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

41세 남성 환자로 3개월 전부터 시작된 알레르기 비염 증상과 흑색변, 피로감을 호소한다. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력이 있으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다. 최근 집 대청소 후 증상이 악화되었다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 41세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 56kg, BMI는 16.5이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 또한 흑색변, 피로감을 호소한다.

### 【발병 에피소드】

최근 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발생하였다. 증상은 습한 환경과



찬바람에 노출될 때 악화되며, 온찜질을 하면 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상으로 발열은 없으며 오한 또한 호소하지 않는다. 콧물은 지속적으로 흐르고 있으며, 기침은 하루 종일 지속적으로 나타난다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 약간 있는 편이다. 코가려움은 경미하여 무시할 만한 정도이다. 요통은 통증 강도 2/10으로 경미하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력이 있으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

사무직에 종사하며, 매일 음주를 하고 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화 상태는 좋지 않다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 묽거나 연변의 형태이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 89회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 크다.

- 설태: 백태가 두껍게 덮여 있다.

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:27

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 74kg
- 활력징후: BP 116/76 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

56세 남성 환자로, 3개월 전부터 악화되는 알레르기 비염을 주소로 내원함. 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 증상 시작. 콧물, 코막힘, 코 가려움 심함. 당뇨, 고혈압 가족력 있음.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 74kg, BMI는 23.4이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 콧물, 코막힘, 코 가려움 증상을 호소하였다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 불가능하다고 한다. 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 매우 힘들다고 한다. 찬바람에

증상이 악화되고, 안정 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

당뇨 진단을 받고 약물 복용 중이다.

**【가족력】**

가족 중 고혈압 환자가 있다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 높은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 간헐적으로 나타난다(2/5).
- 대변: 1회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 5시간 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 간헐적으로 나타나며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 저하되었으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 116/76 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.5°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 각질과 가려움증이 있다. 이명(3/5)과 난청(4/5)을 호소하며, 어지러움(3/5)을 느낀다.
- 면색: 홍조를 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:37

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 34세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 78kg
- 활력징후: BP 111/71 mmHg, 맥박 82/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

34세 여성 환자로, 1개월 전 새 카펫 설치 후 발생한 알레르기 비염 증상 (코막힘, 재채기, 코가려움)과 다한, 오한, 잦은 야간뇨, 소화불량, 요통, 사지무력감, 이명, 난청 등을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 34세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 78kg, BMI는 28.7이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (코막힘, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 또한 다한, 오한, 잦은 야간뇨, 소화불량, 요통, 사지무력감, 이명, 난청 등을 동반하고 있다.

### 【발병 에피소드】

환자는 새 카펫을 깔 후 4일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 코막힘이 심하여 코로 숨쉬기 어려움을 겪고 있다.

재채기를 자주 하며 코가려움 또한 심하여 자주 비빈다. 콧물은 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하게 된다. 발열은 없으나 오한을 느끼며, 땀을 많이 흘리고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다. 또한 요통 (3/10) 및 사지무력감을 호소한다. 소화불량으로 복만 및 복통 (3/5)이 있으며, 이명 (3/5)과 난청 (4/5) 증상도 동반한다. 증상은 수면 및 식이 조절 시 다소 완화되나, 흡연 및 장시간 앉아있을 경우 악화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압 및 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하는 편이다. 흡연은 15개피/일 정도이며, 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 없는 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일, 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 (3/5)이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색 변을 보며, 성상은 보통이다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 (多汗) 경향이 있으며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 (3/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 111/71 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 36.3℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 보이나 가려움이 있다. 면색은 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥, 부색



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:45

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 35세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 73kg
- 활력징후: BP 115/79 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

35세 남성, 1년 이상 만성 알레르기 비염을 호소하며, 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 증상 악화. 수면 부족과 습한 환경에 의해 악화되며, 온찜질과 식이 조절로 완화됨. 전신 부종, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 35세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 73kg, BMI는 22.3이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소한다. 증상은 반려동물이 있는 환경에 노출된 후 악화되었으며, 수면 부족 및 습한 환경에 의해 더욱 심해지는 경향을 보인다. 온찜질 및 식이 조절 시 증상이 다소 완화된다. 콧물은

지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 재채기는 간헐적으로 발생한다. 코막힘은 경미하며, 코 가려움증을 자주 호소한다. 동반 증상으로 전신 부종, 사지 무력감, 피부 건조 및 가려움이 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 특이 소화기 증상은 없으나 복만 및 복통 2/5 정도 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 주간 12회, 야간 0회, 적색/혈뇨 증상을 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/79 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.0℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:15:53

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 14세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 53kg
- 활력징후: BP 158/97 mmHg, 맥박 88/분, 체온 37.7°C

## ■ 요약

14세 여성 환자로, 1개월 전 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 14세 여성 환자로 학생이다. 신장은 154cm, 체중은 53kg, BMI는 22.3이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량(복만/복통)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

집 대청소 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

1개월 전 집 대청소 이후 알레르기비염 증상이 발생하였으며, 현재 재채기를 자주 하고 코막힘과 코가려움이 있다. 콧물은 경미하게 나타난다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 4/5 정도로 나타난다.

현재 증상은 호전 중이라고 한다.

**【과거력】**

특이 약물력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨와 중풍이 있다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다. 여성력으로는 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 0/10이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이다. 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 5점 만점에 5점이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었고, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 158/97 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 37.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 0/5이다. 어지러움은 없다. 면색은 황색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태, 박태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 대맥이다.
- 맥력: 유력하다.
- 맥상: 완맥이다.

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 111/67 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

62세 여성 환자로, 6개월 전부터 시작된 알레르기 비염과 관련된 재채기, 코막힘, 그리고 요통, 소화불량, 무력감을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량, 전신 무력감을 주소로 내원하였다. 증상은 새로 이사한 집에서 2일간 지낸 후 시작되었으며, 현재 악화 중이다.

### 【발병 에피소드】

환자는 최근 새로운 집으로 이사한 후 2일 후부터 증상이 발현되었다고 한다.

### 【현병력】

6개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 나타나기 시작했으며, 재채기는 매일 지속적으로 발생하고, 코막힘이 심하여

호흡이 불편하다고 호소한다. 코 가려움은 경미한 수준이다. 요통은 강도 2/10 정도로 나타나며, 소화불량으로 복만/복통이 2/5 정도로 느껴진다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 두부에 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 땀: 무한이며, 두부에서 땀이 난 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/67 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.8℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하고, 피부는 건조하며 각질이 있다. 어지러움은 3/5 정도이다. 이명(0/5), 난청(0/5)
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 황태, 후태



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:12

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 77세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 60kg
- 활력징후: BP 105/61 mmHg, 맥박 100/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

77세 남성 환자로, 6개월 전 반려동물 접촉 후 발생한 알레르기 비염, 잦은 기침, 콧물, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량, 수면불량, 무한, 오한, 수족냉증, 사지무력감, 피부건조, 이명, 난청, 어지럼증, 기억력 저하 등을 호소함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 77세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 60kg, BMI는 20.5이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염, 잦은 기침, 콧물, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량, 수면불량, 무한, 오한, 수족냉증, 사지무력감, 피부건조, 이명, 난청, 어지럼증, 기억력 저하 등을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발현되었으며, 이후 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움 등의

증상이 지속되고 있다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 양상을 보인다. 기침 또한 빈번하게 발생한다. 요통은 통증 강도 3/10 정도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 3/5 정도로 나타난다. 전반적인 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 당뇨를 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 0.0개피/일 정도이며, 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 4회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다. 의욕은 보통 수준이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/61 mmHg, 맥박 100회/분, 체온 36.4℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 유력이다.
- 맥상: 활맥이며, 복합맥상으로 부삭맥이 나타난다.

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:20

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 23세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 65kg
- 활력징후: BP 132/80 mmHg, 맥박 118/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

23세 여성, 1주 전 새 카펫 설치 후 알레르기 비염 증상 악화, 코막힘, 재채기, 코가려움, 피로감, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 23세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 65kg, BMI는 24.5이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염으로 인한 코막힘, 재채기, 코가려움, 피로감, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 1주 전 새 카펫을 설치한 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되어 코막힘, 재채기, 코가려움이 심해졌으며, 특히 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 어렵고, 재채기는 발작 수준으로 나타난다. 콧물이 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 달고 살아야 하며, 코를 풀어도 금방 다시 찬다. 또한, 피로감과 함께 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다.

## 【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피, 운동 강도는 낮다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통 2/5
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 2/10
- 정신/정서: 건망이 있으며 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 높은 편이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/80 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 36.4°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하나 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5 정도이며, 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

## 【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 회태, 후태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:29

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 36세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 78kg
- 활력징후: BP 117/66 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

36세 여성 환자로, 1주 전부터 발생한 알레르기비염 증상 (심한 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움), 잦은 목변, 오한, 피로감, 4/5 강도의 이명, 5/5 강도의 난청을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 36세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 155cm, 체중은 78kg, BMI는 32.5이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염 증상 (심한 콧물, 코막힘, 재채기, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 4일째부터 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전부터 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아지는 증상을 호소하며, 이로 인해 코 주변 피부가 헐고 집중이 어려운 상태이다. 재채기를 자주 하고, 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 매우 힘들다고 한다. 코가려움 또한 심하여 자주



비비는 모습이 관찰된다. 환자는 발열은 없으나 오한을 느끼며, 하루 종일 지속적인 기침을 한다. 또한, 2/10 강도의 요통과 2/5 강도의 복만/복통을 호소한다.

**【과거력】**

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에서 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 2/10 강도로 있다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 117/66 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종과 멍이 절로 생기는 증상이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 후태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:36

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 150cm / 42kg
- 활력징후: BP 118/63 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

13세 남학생으로 3개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기비염 증상 악화되어 내원함. 주 증상은 심한 콧물, 코가려움, 코막힘, 요통, 소화불량, 무력감, 오한 등이다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 13세 남환으로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 42kg, BMI는 18.7이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염 증상 악화를 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

3개월 전 이사 후 콧물이 심하게 흐르는 증상이 발생하였으며, 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 한다. 코 주변 피부가 헐었으며, 집중이 어렵다고 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기는 편하다고

한다. 코가려움이 심하여 일상생활에 방해를 받는다고 한다. 요통은 강도 2/10이며, 복만/복통은 2/5 정도이다. 증상이 점차 악화되는 추세이다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨와 중풍이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 전신에서 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 118/63 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.4℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있으나 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:44

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 76세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 61kg
- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

76세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 76세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 152cm, 체중은 61kg, BMI는 26.4이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 6일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기비염 증상을 보이기 시작했으며, 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다. 특히 꽃가루가 심하게 날리는 시기에 증상이 악화되는 양상을 보인다. 감기 증상으로는 발열은 없으나 콧물이 계속 흐르고 재채기를 지속적으로 한다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기는 편하며 코 가려움이 매우 심하다. 요통은 통증 강도

4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다(4/5).

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

## 【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 과거에 소량 하였으나 현재는 거의 하지 않는다(0.0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애(1/5), 중도각성(0/5)이 있다.
- 한열: 오한/추위를 타는 경향이 있으며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 무기력하며 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/66 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.3°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:16:53

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 11세 / 남
- 신장/체중: 136cm / 41kg
- 활력징후: BP 140/95 mmHg, 맥박 71/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

11세 남환, 6개월 전 발병한 알레르기 비염으로 콧물, 코막힘, 코가려움, 묽은 변, 다한, 오한, 수족냉증, 어지러움, 무력감 등을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 11세 남환으로 학생이다. 신장은 136cm, 체중은 41kg, BMI는 22.2이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 봄철 꽃가루가 날리는 시기에 알레르기 비염 증상이 처음 발현되었으며, 이후 증상이 호전과 악화를 반복하고 있다. 최근 3일 동안 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 증상이 심해졌으며, 특히 콧물이 심하여 일상생활에

지장을 받고 있다. 수면 부족 시 증상이 악화되고, 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

### 【과거력】

특이 과거력은 없다.

### 【가족력】

특이 가족력은 없다.

### 【사회력】

환자는 학생으로, 음주 및 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

### 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회, 적색/혈뇨를 보인다.
- 수면: 10시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력감을 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

### 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/95 mmHg, 맥박 71회/분, 체온 36.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

### 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소설(小舌)
- 설태: 황태, 박태

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 46kg
- 활력징후: BP 127/87 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

27세 남성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 호소하며 내원함. 직장 내 사무실 이전 후 증상 시작되었으며, 과로와 스트레스에 의해 악화됨. 변비, 수면 불량, 사지무력감, 잦은 재채기 및 코막힘, 복만/복통을 동반함.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 46kg, BMI는 13.7이다.

### 【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘)이 발현되었으며, 시간이 지남에 따라

증상이 비슷하거나 오르내림을 반복하고 있다. 과로 및 스트레스 시 증상이 악화되는 경향을 보이며, 식이조절 및 안정을 취할 경우 증상이 다소 완화된다고 한다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타나며, 소화불량 증상으로 복만/복통을 4/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압이 있다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 평소 운동 강도는 높다고 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 흑색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 긴 편이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다고 한다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 전신에서 땀이 난다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 낮으며 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어진다고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 127/87 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.0°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 회태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:11

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 75kg
- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 107/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

17세 여성 환자로 1개월 전부터 알레르기비염 증상 및 요통, 소화불량을 호소한다. 새 카펫 설치 후 증상 악화되었으며, 평소 기름진 음식, 과로, 스트레스에 의해 증상이 심화된다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 153cm, 체중은 75kg, BMI는 32.0이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 전부터 알레르기비염 증상(콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움)이 발생하였다. 콧물은 휴지를 자주 사용하게 될 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이다. 재채기는 빈번하게 나타나고, 코가려움은

일상생활에 지장을 줄 정도로 심하다. 또한 요통(통증 강도 4/10)과 소화불량(복만/복통 4/5)을 동반한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 기름진 음식 섭취, 과로, 스트레스 시 악화된다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 여성력으로는 생리주기 28일, 규칙적인 생리, 생리통 0/10이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다. 복만, 복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 2회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 수면의 질은 얇고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)
- 정신/정서: 기억력은 좋으며, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 105/68 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 36.6°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다.
- 면색: 황색

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다(小).



- 설태: 백태, 후태

### 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:19

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 35kg
- 활력징후: BP 117/63 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

10세 여자 환자로, 1주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염 증상 (심한 콧물, 재채기, 코막힘)을 주소로 내원.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 35kg, BMI는 18.4이다.

### 【주소증】

1주 전부터 심한 콧물, 재채기, 코막힘을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

### 【현병력】

상기 환아는 1주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 재채기, 콧물 증상 발현되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내리는 경과를 보인다. 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이

불가능하다고 호소한다. 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편하며, 코가려움은 경미하다. 요통 (통증강도 4/10) 및 복만/복통 (4/5)을 호소한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

**【사회력】**

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간 수면, 깊게 잠들지만 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한이 있으며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 117/63 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.8℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부 건조도가 있고 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:27

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 144cm / 39kg
- 활력징후: BP 109/65 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

10세 남환, 6개월 전 알레르기 비염 발병 후 호전 중. 집 대청소 후 증상 악화. 잦은 재채기, 코 가려움, 경미한 코막힘, 혈뇨, 수족냉증, 사지무력감, 잦은 멍, 이명, 어지러움, 식사 불규칙, 기상 시 피로감을 호소.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 39kg, BMI는 18.8이다.

### 【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 전 알레르기 비염 진단 후 증상이 호전되던 중, 최근 집 대청소 후 재채기, 코 가려움, 코막힘 등의 증상이 심해졌다. 특히 코 가려움이 심하여 일상생활에 불편감을 느끼고 있으며, 콧물은 경미하다. 잦은 재채기를

호소한다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화되는 경향을 보인다. 요통은 강도 2/10으로 미미하며, 복만/복통은 2/5 정도로 나타난다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

비음주, 비흡연자이며, 중간 강도의 운동을 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 가끔 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 깊게 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 평소 땀을 보통 정도로 흘리며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕은 보통이며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 109/65 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.8℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이며 어지러움을 4/5 정도 느낀다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 두텁게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:36

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 48세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 71kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.3°C

## ■ 요약

48세 남성, 1개월 전 직장 내 사무실 이동 후 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 고혈압, 이상지질혈증 과거력 및 수면 부족, 기름진 음식 섭취 등의 악화 요인 존재.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 48세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 71kg, BMI는 23.7이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 직장에서 새 사무실로 이동한 후 4일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1개월 전 사무실 이전 후 비염 증상(콧물, 코막힘, 코 가려움), 요통, 소화불량이 발생하여 점차 악화되는 경과를 보이고 있다. 비염 증상으로 콧물이 심하게 흐르고 코막힘이 있으며, 코 가려움이 동반된다고 한다. 요통은 통증 강도



4/10 정도이며, 소화불량은 복만 및 복통을 동반한다. 수면 부족과 기름진 음식 섭취 시 증상이 악화된다고 한다.

## 【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

## 【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 기억력이 저하되었다고 호소한다. 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 사지 무력감을 호소한다. 면색은 홍조를 보인다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 니태가 관찰된다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:44

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 81kg
- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 56/분, 체온 37.1°C

## ■ 요약

58세 여성 환자로 1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 환절기 기온 변화로 증상 악화됨.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 150cm, 체중은 81kg, BMI는 36.0이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상으로 재채기, 콧물, 코가려움 증상을 호소한다. 재채기는 지속적으로 나타나며, 콧물은 심하여 휴지를 자주 사용한다. 코막힘은 경미하며, 코가려움 증상으로 코를 자주 비빈다. 또한 요통을 호소하나 통증 강도는 1/10 정도로 미미하다. 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 1/5 정도로 호소한다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력 상 당뇨가 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮고, 장시간 앉아서 근무하는 습관이 있다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 녹색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나(無汗), 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (강도 1/10)
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 56회/분, 체온 37.1°C, 호흡 21회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 절로 생긴다고 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 가려움증은 없다.
- 면색: 정상이다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 썩소하다.
- 설태: 백태가 있으며,膩苔이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:17:53

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 68kg
- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 107/분, 체온 36.5°C

## ■ 요약

18세 여성 환자로, 1주 전 반려동물을 키우는 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상, 요통, 소화불량, 무력감 등을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 68kg, BMI는 30.2이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량, 사지무력감을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전 친구 집 방문 후 재채기, 콧물, 코가려움 등의 비염 증상이 나타났다고 한다. 코막힘은 심하지 않다고 호소하였다. 또한, 복만, 복통 등의 소화불량 증상과 4/10 강도의 요통을 호소하며, 전반적인 사지무력감을 느낀다고

한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다고 한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물도 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루 5개피 정도 한다고 한다. 운동은 거의 하지 않는다고 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통은 4/5 강도이다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황갈색이고 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 깊은 편이나, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면 장애는 0/5, 중도 각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉하다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 느끼며, 의욕이 없고 무기력하다고 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 102/67 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 36.5°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 멍이 잘 드는 편이다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 부종은 없다. 이명 강도는 5/5, 난청은 1/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 암색이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 크다(大/태).
- 설태: 회색이고 니태이다.

**【맥진 소견】**

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥



# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:02

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 39세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 57kg
- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 73/분, 체온 38.1°C

## ■ 요약

39세 여성 환자로, 1주 전 반려동물 접촉 후 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기) 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 39세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 57kg, BMI는 26.0이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1주 전 친구 집 방문 후 콧물, 코막힘, 재채기 등의 비염 증상이 발생하였다고 한다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이라고 한다. 재채기는 간헐적으로 나타난다. 요통은 통증

강도 4/10 정도이며, 장시간 앉거나 무거운 짐을 들 때 악화되고, 스트레칭이나 수면 시 완화된다고 한다. 소화불량 증상으로 복만/복통을 4/5 정도로 호소한다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

가족력으로 당뇨가 있다.

**【사회력】**

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도로 나타난다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 158/94 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 38.1℃, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 강홍/자설, 소(小)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:10

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 51세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 69kg
- 활력징후: BP 145/90 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.8°C

## ■ 요약

51세 남성, 3개월 전 반려동물 접촉 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 51세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 69kg, BMI는 23.1이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 친구 집 방문 후 재채기, 코막힘, 코 가려움 등의 알레르기 비염 증상이 발현되었다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다. 요통은 강도 4/10으로 지속되고 있다. 또한, 복만/복통이 4/5 강도로 나타나는 소화불량을 호소한다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

## 【가족력】

심장병 가족력이 있다.

## 【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한이 나타나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (4/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/90 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조한 편이다. 사지무력감은 호소하지 않는다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지러움은 3/5 강도로 나타난다.
- 면색: 정상

## 【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:17

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 74kg
- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 101/분, 체온 37.0°C

## ■ 요약

19세 남성 환자로, 1년 이상 만성 알레르기 비염을 호소하며, 최근 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 증상 악화되어 내원함. 요통, 소화불량, 피로감, 수면장애, 다한 등의 증상 동반.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 74kg, BMI는 24.7이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 최근 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움 등의 비염 증상이 악화되었다. 또한, 요통 (통증 강도 4/10)과 복만/복통

(4/5)의 소화불량 증상을 동반하고 있다. 무거운 짐을 들거나 과로하면 증상이 악화되고, 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

직업은 현장직이며, 음주는 가끔 하고 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 높다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 (복만/복통)을 호소한다. 오심/구토는 없다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많으며, 땀을 흘린 후 피곤하거나 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)이 있다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처력은 보통, 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 119/77 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 37.0℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 부종은 없고 절로 멍이 잘 생긴다고 한다. 피부는 정상 건조도이며 가려움이 있다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 창백하다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태가 끼었다.



【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:18:24

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 마황부자세신탕
- 나이/성별: 20세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 69kg
- 활력징후: BP 137/89 mmHg, 맥박 110/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

20세 남성, 만성 알레르기비염, 재채기, 코막힘, 코가려움, 흑색변, 다한, 오한, 어지러움 호소

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 20세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 69kg, BMI는 23.3이다.

### 【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염, 잦은 재채기, 코막힘, 코가려움, 흑색변, 다한, 오한, 어지러움을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 습한 환경에서 증상이 악화되고, 수면 및 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상으로 발열은 없으며, 콧물은 중등도로 계속 흘러나오고, 하루 종일 지속적인 기침을 한다. 비염 증상으로 재채기를 자주 하고, 코막힘이 있어 숨쉬기 약간 불편하며,

코가 심하게 가렵다. 요통은 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일, 운동강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하다. 복만/복통 4/5
- 대변: 1회/일, 흑색, 굳음/경변
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 5시간, 얕은 잠, 기상 시 피곤함, 입면장애 0/5, 중도각성 0/5
- 한열: 오한, 추위를 탐, 온수를 선호, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한, 야간/도한, 땀 흘린 후 피곤/냉함
- 통증: 요통 강도 4/10
- 정신/정서: 건망, 무기력, 스트레스 대처력 저하

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/89 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 37.2℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감 호소, 피부 건조도는 정상, 부종 없음, 멍들 정상, 어지러움 5/5, 이명 1/5, 난청 1/5, 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 大/태
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 흥맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥