

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:11:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 55kg
- 활력징후: BP 109/72 mmHg, 맥박 81/분, 체온 35.5°C

■ 요약

16세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)과 함께 요통, 소화불량, 전신 부종, 사지무력감, 잦은 흑색변, 오한, 야간 도한을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 55kg, BMI는 21.5이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전 새로운 집으로 이사 후 알레르기비염 증상(재채기 발작, 코막힘, 코가려움)이 발생하였다. 동반되는 증상으로 요통(통증 강도 4/10), 복만/복통(4/5), 전신 부종, 사지무력감이 있다. 악화 요인으로 장시간 앉아있는 자세가

있으며, 스트레칭 및 안정을 취하면 증상이 완화된다. 감기 증상으로 발열은 없으며(35도 이하의 저체온), 오한 증상은 나타나지 않고, 콧물은 지속적으로 흐르는 양상이다. 기침은 하지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 5개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 섭취하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통의 형태이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 9회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀이 잘 나지 않으나(無汗), 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통(4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/72 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 35.5℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 이명(3/5), 난청(3/5), 어지러움(4/5)이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀가 얇다(小).
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥