

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:51:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 69kg
- 활력징후: BP 159/91 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.7°C

■ 요약

30세 남성, 2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하는 환자. 직장 내 사무실 이동 후 증상 시작. 당뇨 및 이상지질혈증 기저질환 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 69kg, BMI는 24.4이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 4일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 콧물이 심하게 흐르고 코 주변 피부가 헐어 불편감을 느낀다고 한다. 재채기를 자주 하며 코막힘으로 숨쉬기 약간 불편하고 코가려움 증상도 일부 있다. 요통은 강도

4/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 증상은 호전 중이며, 기름진 음식을 섭취하면 악화되고 스트레칭이나 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

기저 질환으로 당뇨 및 이상지질혈증을 앓고 있으며, 관련 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍 이력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 대변량은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 수면의 질이 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 의욕이 낮으나 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 159/91 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.7℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 들고, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 0/5 이며, 어지러움은 3/5 강도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭