

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:52:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 146cm / 47kg
- 활력징후: BP 113/62 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.3°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 146cm, 체중은 47kg, BMI는 22.0이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

집 대청소 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상이 악화되었으며, 콧물, 코막힘, 코가려움 증상을 호소한다. 콧물은 심하여 휴지를 자주 사용하게 되며, 코를 푸는 횟수가 늘었다고 한다. 요통은 통증 강도 2/10이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다. 악화요인으로 음주와 습한 환경을 언급하였고, 식이조절과 휴식 시 증상

완화를 느낀다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이다. 소화불량을 호소하며, 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간/도한 증상이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 113/62 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.
- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이며, 복합맥상으로 부허맥이 나타난다.