

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 58세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 71kg
- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.8°C

■ 요약

58세 남성, 3개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 71kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 5일째부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 3개월 전 사무실 이동 후 알레르기 비염 증상(재채기 발작, 심한 코막힘, 코 가려움)이 발생하여 만성적으로 악화되는 양상을 보이고 있다. 요통은 강도 3/10으로 지속되며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 3/5 정도로 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 무한(無汗) 증상이 나타난다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/93 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.8°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다고 한다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5 정도이며, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허