

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:54:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 월비가반하탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 79kg
- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 91/분, 체온 36.3°C

■ 요약

49세 남성, 3개월 전 이사 후 알레르기 비염, 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 187cm, 체중은 79kg, BMI는 22.6이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상이 나타났으며, 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상으로, 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 호소한다. 코 주변 피부가 헐었으며 집중이 불가능하다고 한다. 재채기를 자주 하고, 코막힘이 있어 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움으로 자주 비빈다고 한다. 또한, 요통(통증 강도 4/10)과

복만/복통(4/5)을 호소한다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 수면 및 스트레칭 시 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 25개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 2회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 기상 시 피곤함을 느끼며, 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/99 mmHg, 맥박 91회/분, 체온 36.3°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 절로 생기며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 4/5 강도로 호소한다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 大/태
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허