

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 79kg
- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 63/분, 체온 37.5°C

■ 요약

20세 여성, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 169cm, 체중은 79kg, BMI는 27.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성 요통을 호소하며, 통증 강도는 4/10으로 평가된다. 통증은 묵직한 느낌(重痛)과 함께 이동하는 양상(遊走痛)을 보이며, 찌르는 듯한 통증(刺痛)과 야간에 심해지는 경향(夜間痛)이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 냉기에 노출 시 통증이 심해지고 따뜻하게 찜질하면 완화되는 양상(得溫則減)을 보인다. 과로, 습한 환경,

음주 시 증상이 악화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 35개피/일 정도이다. 운동은 중강도로 꾸준히 하고 있다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (1/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 자주 느낀다. 오심, 구토 증상이 있고, 부패취의 트림을 하며, 신물이 올라오고, 입이 쓰다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 묽거나 무른 변을 보는 경향이 있다.
- 소변: 소변 색깔이 붉고 혈뇨가 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 식은땀을 흘리고, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 사지 무력감을 호소한다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 무기력함을 느낀다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 63회/분, 체온 37.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 경미하다 (1/5).
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(小).

- 설태: 회색을 띄며, 끈적한 니태(膩苔)가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 대맥(大脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 허대(虛大)