

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 83세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 79kg
- 활력징후: BP 104/71 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.2°C

■ 요약

83세 남성 환자로, 1개월 이상 3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 과로, 수면 부족, 찬바람/냉기에 의해 증상이 악화되고, 수면 및 스트레칭으로 완화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 83세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 79kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내부터 요통이 발생하였으며, 장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(Heavy), 유주통(Moving), 자통(Stabbing), 야간통(Worse at Night), 오래

서있으면 악화되는 양상, 한통(Cold Pain), 득온즉감(Better w/ Warmth)의 특징을 보인다. 과로, 수면 부족, 찬바람/냉기에 의해 증상이 악화되며, 수면 및 스트레칭으로 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병을 앓는 사람이 있다.

【사회력】

현장직에 종사하며, 음주를 자주 하고, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통 2/5, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색, 굳음/경변
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회
- 수면: 3시간, 얕은 수면, 기상 시 무거움을 느끼며, 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타며, 온수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/71 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.2℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 멍이 절로 생기며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 담홍, 대/태
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허