

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 58kg
- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.2°C

■ 요약

45세 여성 환자로, 1주일 이내 무거운 물건을 들다가 발생한 요통을 주소로 내원함. 평소 이상지질혈증을 앓고 있으며, 수면 부족, 스트레스, 무거운 짐으로 인해 악화되고, 식이 조절과 수면으로 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 151cm, 체중은 58kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

1주일 이내 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주일 전 무거운 물건을 들다가 요통이 발생하였다고 한다. 통증은 4/10 강도로 나타나며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 호소한다.

평소 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이며, 수면 부족, 스트레스, 무거운 짐을 드는 행위가 악화 요인으로 작용하고, 식이 조절과 충분한 수면이 완화 요인으로 작용한다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 복만/복통 4/5, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 깊게 잠들지 못하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간에 땀을 많이 흘리고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 중통, 유주통, 자통의 양상이고, 강도는 4/10 이다. 오래 서 있을 때 심해지고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 절로 멍이 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5, 어지러움은 0/5 이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 회태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 허대