

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:23:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 10세 / 여
- 신장/체중: 132cm / 31kg
- 활력징후: BP 135/86 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.2°C

■ 요약

10세 여자 환자로, 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 발생한 요통을 주소로 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 여자 환자로 학생이다. 신장은 132cm, 체중은 31kg, BMI는 17.8이다.

【주소증】

3개월 이상-6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

헬스장에서 데드리프트 운동 중 허리에 통증이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 헬스장에서 데드리프트 운동 중 요통이 발생한 이후 증상이 점차 악화되는 양상이다. 통증은 3/10 정도로, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있으면 통증이 악화되고 따뜻하게 하면 호전되는 양상이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않고, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 배변하며, 녹색 변을 보고 묽거나 연변의 형태를 보인다.
- 소변: 소변 색깔은 적색 또는 혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리는 다한(多汗) 증상이 있으며, 특히 야간에 도한(盜汗)이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕이 없고 무기력감을 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/86 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.2°C, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍(絳紅) 또는 자설(紫舌)이며, 설체가 크다.
- 설태: 회태(灰苔) 또는 니태(膩苔)가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥(沈脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)

- 맥력: 무력(無力)

- 맥상: 완맥(緩脈)