

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:24:36

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 52세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 78kg
- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 54/분, 체온 37.5°C

■ 요약

52세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 빠긋한 이후 증상 악화. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 잦은 소화불량, 수면 문제, 오한, 무한 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 160cm, 체중은 78kg, BMI는 30.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 빠긋하였다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 빠긋한 이후 요통이 발생하여 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 둔중하며, 움직일 때 심해지고 야간에 더욱 심해지는 경향을 보인다. 오래 서 있을 때 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 통증이

완화된다고 호소한다. 또한, 환자는 수족냉증을 동반하며, 잦은 소화불량을 호소한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압과 심장병력이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 중등도의 운동을 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 뭉거나 연변의 형태를 보인다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호한다. 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 둔통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/76 mmHg, 맥박 54회/분, 체온 37.5°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 멍이 잘 드는 편이다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색을 띄며, 크기가 크다(Enlarged).
- 설태: 백태가 박하게 덮여있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥