

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 47kg
- 활력징후: BP 133/81 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.9°C

■ 요약

66세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다. 장거리 비행 후 발생하였으며, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 47kg, BMI는 16.1이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상이며, 밤에 더 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 당뇨로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 4회 하며, 소화는 보통이다. 구역감과 구토감이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얇게 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이며, 묵직하고 움직일 때 심해지는 양상이다. 밤에 더 심해지는 경향이 있다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없는 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/81 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 정상이다.
- 설태: 황태와 박태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 부삭