

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 78kg
- 활력징후: BP 175/102 mmHg, 맥박 90/분, 체온 37.1°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 변비, 수면장애, 다한, 오한, 사지무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 78kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1개월 이상 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 요통이 점차 악화되는 추세이며, 통증 강도는 1/10 정도로 경미하다. 통증 양상은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보이며, 오래 서 있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을

보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 진단받고 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 여성력으로는 폐경이 되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색 변을 보고, 배변 활동은 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀을 많이 흘리며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 175/102 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 37.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 부종은 없고 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 0/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5로 나타난다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 크기는 크다.
- 설태: 백태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥