

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:25:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 59세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 84kg
- 활력징후: BP 128/89 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.1°C

■ 요약

59세 여성 환자로, 장거리 비행 후 발생한 요통을 주소로 내원. 이상지질혈증, 고혈압의 기왕력이 있으며, 오래 앉아있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 양상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 84kg, BMI는 29.8이다.

【주소증】

1주에서 1개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전 장거리 비행 후 발생한 요통을 호소한다. 통증은 둔중하며, 움직일 때 심해지는 양상을 보이고, 칼로 찌르는 듯한 통증과 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하거나 온찜질을 하면 다소

완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 과거에 소량(0.0개피/일) 하였으나 현재는 금연 중이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 복만감과 복통(2/5)을 호소한다. 오심/구토 증상이 있으며, 부패취의 트림을 하고 신물이 올라온다고 한다. 또한, 입이 쓰다고 한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 굳기이다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(3/5), 중도각성(2/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이며, 둔중하고 움직이는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고, 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 128/89 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 명이 잘 드는 편이며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 어지럼증(4/5)을 호소하며, 이명(3/5), 난청(2/5)이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 회색의 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴