

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 187cm / 78kg
- 활력징후: BP 103/63 mmHg, 맥박 78/분, 체온 37.7°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1주일 이내 이사 중 허리 삐끗 후 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 변비, 수족냉증, 어지럼증, 피로감을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 187cm, 체중은 78kg, BMI는 22.3이다.

【주소증】

1주일 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 삐끗하였다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 이사 중 허리를 삐끗한 후 요통이 발생하였다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서 있을 때 악화된다. 온찜질 시 통증이 경감되는 경향을 보인다. 환자는 발열은 없으나

오한을 느끼며, 어지럼증과 피로감을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피이다. 평소 운동강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 간헐적으로 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 4회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면이 얇고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에서 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 쑤시는 듯한 통증과 찌르는 듯한 통증이 동반된다. 오래 서 있으면 악화된다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/63 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감은 없으며, 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 회태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색