

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:26:43

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 85세 / 남
- 신장/체중: 170cm / 79kg
- 활력징후: BP 114/71 mmHg, 맥박 81/분, 체온 37.2°C

## ■ 요약

85세 남성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 장시간 운전 후 허리 뻣뻣함이 시작되었으며, 온찜질과 휴식 시 완화된다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 85세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 79kg, BMI는 27.3이다.

### 【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 1개월 이상 전부터 요통이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 통증은 묵직하고 움직일 때마다 심해지며, 밤에 더욱 심해지는 양상을 보인다. 온찜질과 휴식을 취하면 통증이 다소 완화된다고 한다. 요통 외에 수족냉증과 다한

증상을 호소한다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상은 가끔 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽거나 연변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 1회 소변을 보며, 혈뇨를 보인다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 많이 탄다. 찬 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 주로 두부에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 2/10이며, 목직하고 움직일 때 심해지며, 밤에 악화된다. 차가운 환경에서 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮은 편이며, 기억력은 좋지 않다. 의욕은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 114/71 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 37.2°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 정상이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 대설(Enlarged)
- 설태: 회색, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥