

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 64세 / 남
- 신장/체중: 182cm / 61kg
- 활력징후: BP 116/71 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.8°C

■ 요약

64세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 찬바람과 무거운 짐을 들 때 증상이 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 64세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 182cm, 체중은 61kg, BMI는 18.4이다.

【주소증】

발현 시점은 6개월 이상-1년 이내이며, 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

무거운 물건을 들다가 '뚝' 소리와 함께 허리 통증이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 야간에 심해지고 오래 서있을 때 악화된다. 찬바람이나 무거운 짐을 들 때 통증이 악화되며,

따뜻하게 하면 호전되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있고 부패취와 신물이 올라온다고 호소하며 구고(입이 씹) 증상을 동반한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 본다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보며, 주간 2회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한(多汗)이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/71 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.8℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥