

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:27:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 칠기탕, 소간해울탕
- 나이/성별: 47세 / 여
- 신장/체중: 169cm / 49kg
- 활력징후: BP 139/84 mmHg, 맥박 62/분, 체온 36.0°C

■ 요약

47세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발현한 요통을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다. 추운 날씨에 야외 작업을 한 후 허리가 굳어지기 시작했으며, 과로 시 증상이 악화된다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 47세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 49kg, BMI는 17.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

추운 날씨에 야외 작업을 3시간 한 후 허리가 굳어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 요통이 발생하여 현재까지 지속되고 있다. 통증 강도는 4/10이며, 중통(重痛),

유주통(遊走痛), 자통(刺痛), 야간통(夜間痛)의 양상을 보인다. 오래 서있으면 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향이 있다. 환자는 또한 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고를 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 복만/복통이 4/5로 느껴진다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색의 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗) 경향이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다. 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/84 mmHg, 맥박 62회/분, 체온 36.0℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있다. 이명은 없으며 난청이 2/5 정도 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥