

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 70kg
- 활력징후: BP 109/71 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.5°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 1개월 이상에서 3개월 이내의 요통을 주소로 내원하였다. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스트레스와 흡연이 악화 요인으로 작용한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 164cm, 체중은 70kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

1개월 이상에서 3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 호전 중이다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 요통을 호소하며, 통증 강도는 1/10이다. 통증 양상은 중통(Heavy) - 습, 유주통(Moving) - 담음, 자통(Stabbing) - 어혈, 야간통(Worse at Night) - 어혈, 오래 서있으면 악화 - 기, 한통(Cold Pain) - 한, 득온즉감(Better w/ Warmth) -

한의 양상을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 30일로 규칙적이나, Menopause 상태이며, 생리통은 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 복만/복통은 1/5 정도이다. 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상이 나타난다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얕은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한(無汗)이며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외 특별한 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/71 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.5°C, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 명이 절로 생긴다. 피부는 각질이 있고 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대/태
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대