

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:02:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 154cm / 72kg
- 활력징후: BP 107/60 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.3°C

■ 요약

77세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압이 있으며, 스트레스, 무거운 짐, 수면 부족 시 악화되는 경향을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 154cm, 체중은 72kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

오랜 시간 책상에 앉아 일한 후 6일 전부터 허리가 아프기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증 강도는 2/10이며, 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이고, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있거나 스트레스를 받거나 무거운 짐을

들거나 수면이 부족할 때 악화되며, 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다. 또한, 한랭한 환경에서 통증이 심해지고 따뜻하게 하면 통증이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 구역/구토 증상이 있고, 부패취의 트림을 하며, 신물이 올라오고, 구고(입안이 쓴 증상)를 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 1회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에서 다한(多汗)이 나타나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10), 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 야간에 심해진다. 오래 서 있거나, 한랭한 환경에서 심해지고 따뜻하게 하면 완화된다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/60 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.3℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 어지러움을 호소한다 (5/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭