

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 58kg
- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.1°C

■ 요약

69세 남성, 6개월 전 잠을 잘못 잔 후 발생한 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 58kg, BMI는 18.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 둔하고 무거운 느낌이며, 움직일 때 심해지는 양상을 보인다. 야간에 통증이 심해지고, 오래 서 있을 때 악화된다고 한다. 따뜻하게 하면 통증이 다소 완화되는 경향이 있다. 과로하거나 찬바람을 쐬면 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 고강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 구역감은 간헐적으로 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간에 9회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 자지 못하며, 아침에 일어날 때 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 중도각성이 5회 중 1회 있다.
- 한열: 평소 더위를 타는 경향은 아니며, 수족냉증이 있다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 오히려 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10 정도이며, 둔하고 무거운 느낌이다. 움직일 때 통증이 심해지고, 야간에 악화된다. 냉기에 노출되거나 오래 서 있을 때 통증이 심해진다.
- 정신/정서: 스트레스 대처는 잘 하는 편이며, 기억력은 다소 감퇴되었으나, 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/78 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신에 부종은 없으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥