

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 69kg
- 활력징후: BP 115/60 mmHg, 맥박 67/분, 체온 36.7°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 1개월 이상 전부터 발생한 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증과 당뇨를 앓고 있으며, 흡연과 음주를 한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직에 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 69kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1개월 이상에서 3개월 이내부터 발생한 요통을 주소로 내원하였다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복하는 양상을 보인다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작하였다.

【현병력】

요통은 중통(重痛), 유주통(流注痛), 자통(刺痛)의 양상을 띠며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되고,

따뜻하게 하면 완화된다. 한기를 느끼는 통증이다. 환자는 통증 강도를 1/10으로 표현했다.

【과거력】

이상지질혈증과 당뇨를 앓고 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 하루 5개피의 담배를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 규칙적이다. 복만/복통은 1/5 정도로 경미하며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 외에 다른 부위의 통증은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/60 mmHg, 맥박 67회/분, 체온 36.7℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감은 호소하지 않으며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움을 3/5 정도 느낀다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀가 크다.
- 설태: 백색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥