

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:03:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 49세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 64kg
- 활력징후: BP 105/63 mmHg, 맥박 103/분, 체온 37.8°C

■ 요약

49세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원. 이사 중 허리 빠긋한 경험 있으며, 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력 존재.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 64kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

이사할 때 짐을 나르다가 허리를 빠긋하였다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통, 유주통, 자통의 양상을 보이며, 특히 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 때 악화되며, 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 통증 강도는 1/10으로

경미하다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약 및 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으며, 중도각성이 있다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력과 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/63 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 37.8℃, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥