

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 60세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 73kg
- 활력징후: BP 158/95 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.7°C

■ 요약

60세 여성 환자로 1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원. 장거리 비행 후 발생, 습한 환경, 스트레스, 과로 시 악화되는 경향을 보임. 이상지질혈증으로 약물 복용 중.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 165cm, 체중은 73kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장거리 비행기 탑승 후 내리면서 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 장거리 비행 후 요통이 발생하여 지속적으로 악화되는 양상을 보인다. 통증은 주로 허리 부위에 나타나며, 습한 환경, 스트레스, 과로 시에 악화되는 경향을 보인다. 통증의 강도는 4/10으로, 중통, 유주통, 자통,

야간통의 양상을 보이며, 오래 서 있을 때 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 복만/복통 4/5, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변, 보통의 형태를 보인다.
- 소변: 맑은 색으로, 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성은 True/5 이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 무한이며, 야간/도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 158/95 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.7°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥, 미약