

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 49세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 61kg
- 활력징후: BP 119/66 mmHg, 맥박 82/분, 체온 37.7°C

■ 요약

49세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 주소로 내원. 잠을 잘못 잔 후 발생한 허리 뻣뻣함과 통증을 호소하며, 스트레스, 기름진 음식 섭취, 장시간 앉아있는 경우 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 49세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 61kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

잠을 잘못 자고 일어난 후 아침부터 허리가 뻣뻣하고 아팠다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 요통을 호소한다. 통증은 잠을 잘못 잔 후 발생했으며, 뻣뻣함과 함께 나타난다. 환자는 통증이 중통(重痛), 유주통(moving pain), 자통(stabbing pain)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는

경향이 있다고 한다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되며, 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다. 환자는 스트레스, 기름진 음식 섭취, 장시간 앉아있는 경우 증상이 악화된다고 호소하며, 식이 조절과 수면을 통해 일부 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주를 자주 한다. 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화는 보통이다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 2/5, 중도각성 1/5이다.
- 한열: 평소 더위, 추위를 타지 않으며, 수족냉증이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 보통 땀이 나며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 허리 부위의 통증 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통, 야간통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 무기력함을 느낀다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/66 mmHg, 맥박 82회/분, 체온 37.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지럼증은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대(enlarged)하다.
- 설태: 황태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약