

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:47

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 54세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 54kg
- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 72/분, 체온 37.1°C

■ 요약

54세 여성 환자로, 1개월 이상-3개월 이내의 요통을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 계단에서 미끄러진 후 허리 통증이 시작됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 여성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 157cm, 체중은 54kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

1개월 이상-3개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

계단에서 미끄러져 엉덩방아를 찧은 후 허리 통증이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 이상-3개월 이내부터 발생한 요통을 호소한다. 통증은 중통(重痛), 유주통(遊走痛), 자통(刺痛)의 양상을 보이며, 야간에 심해지는 경향이 있다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되고 따뜻하게 하면 다소 완화된다고 한다.

스트레스가 악화 요인으로 작용한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 당뇨병 환자가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 있으며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다. 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 좋은 편이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 142/92 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 37.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 가렵다. 사지 무력감을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색의 얇은 설태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부색