

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 20:04:55

■ 환자 기본정보

- 질환명: 요통
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 두충환, 사군자탕
- 나이/성별: 69세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 62kg
- 활력징후: BP 154/95 mmHg, 맥박 70/분, 체온 37.6°C

■ 요약

69세 남성 환자로, 3개월 전 장시간 운전 후 발생한 요통을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 병력 있으며, 흑색변, 혈뇨, 다한, 어지럼증, 이명 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 69세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 174cm, 체중은 62kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

3개월 이상에서 6개월 이내부터 요통을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장시간 운전 후 차에서 내리면서 허리가 뻣뻣해지기 시작했다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 장시간 운전 후 요통이 발생하여 점차 심해지는 양상을 보였다. 요통은 목직하게 누르는 듯한 중통(重痛)의 양상과 함께 이동하는 듯한 유주통(遊走痛), 찌르는 듯한 자통(刺痛)을 동반하며, 야간에 심해지는 경향을

보인다. 오래 서 있을 경우 통증이 악화되고, 따뜻하게 찜질하면 호전되는 양상을 보인다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다. 신물(酸水)이 올라오고 구고(口苦)를 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 변의 상태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간에 9회, 야간에는 배뇨가 없다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 5점 만점 중 2점, 중도각성은 5점 만점 중 1점이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 다한(多汗) 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통의 강도는 1/10이며, 중통, 유주통, 자통의 양상을 보인다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 154/95 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 절로 멍이 잘 든다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침실